

مقایسه اطلاعات آنتروپومتری دانشجویان ایرانی با استاندارد انگلیس و آمریکا

نویسنده‌گان:

احسان الله حبیبی^۱، نسرین صادقی^{۲*}، فریبا منصوری^۳، مهدی صادقی^۴، ملیحه رنجبر^۱

- ۱- بخش مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۲- بخش مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
- ۳- معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
- ۴- بخش مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

Journal of Jahrom University of Medical Sciences, Vol. 10, No. 2, Summer 2012

چکیده:

مقدمه: برخی اختلالات اسکلتی عضلانی، خستگی و خطاهای انسانی ریشه در طراحی نامناسب ابزار و وسائل دارند. طراحی مناسب بر اساس داده‌های آنتروپومتری انجام می‌شود که باید بر خصوصیات جمعیت هدف منطبق باشند. در کشور ما به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی آنتروپومتری، بیشتر از اطلاعات مربوط به کشورهای غربی استفاده می‌شود. هدف طرح، مقایسه ابعاد بدنی افراد ایرانی و غیر ایرانی و نهایتاً تهیه داده برای ایجاد بانک اطلاعات آنتروپومتری منطبق بر ابعاد بدن ایرانیان است که متخصصان ما برای طراحی و ساخت کلیه ابزارها و وسائل از این اطلاعات استفاده کنند.

روش کار: مطالعه مقطعی و آینده‌نگر بوده که به روش مشاهده‌ای انجام شد. جمعیت مورد مطالعه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نمونه‌ها ۳۸۴ مرد و ۳۸۴ زن بودند. ۳۰ متغیر آنتروپومتری توسط آنتروپومتر، کولیس و ترازو اندازه‌گیری شد. اطلاعات توسط نرمافزار SPSS ۱۱/۵ آنالیز و شاخص‌ها و صدک‌های آن‌ها محاسبه گردید. صدک‌های بدست آمده با استاندارد آمریکا و انگلیس مقایسه و درصد اختلاف آن‌ها تعیین شد.

یافته‌ها: شاخص‌های آماری و صدک‌های آنتروپومتریکی به صورت یک بانک اطلاعاتی برای هر دو جنس مشخص شد. مقایسه نتایج این مطالعه با استانداردهای انگلیس و آمریکا اختلاف معنادار اکثر متغیرهای آنتروپومتریکی ایرانیان با این کشورها را نشان داد.

نتیجه‌گیری: ابعاد بدن افراد ایرانی با انگلیسی و آمریکایی متفاوت است و در طراحی ابزارها نمی‌توان از اطلاعات این کشورها استفاده کرد. بانک اطلاعاتی تهیه شده بر پایه اطلاعات جمع‌آوری شده می‌تواند در طراحی و ساخت ابزارها و وسائل مورد نیاز استفاده گردد.

واژگان کلیدی: آنتروپومتری، ابعاد بدن، دانشجویان، بانک اطلاعاتی

J Jahrom Univ Med Sci 2012; 10(2):25-35

و در خصوص انسان از داده‌های آنتروپومتری استفاده می‌شود این داده‌ها می‌بایست کاملاً منطبق بر خصوصیات جمعیت هدف باشد [۲]. با استفاده از اصول آنتروپومتری در طراحی، این امکان وجود دارد که افراد گوناگون با ابعاد بدنی متفاوت آسایش و راحتی جسمانی خود را هنگام کار بازیابند [۳].

مقدمه: اختلالات اسکلتی- عضلانی، خستگی‌های زودرس ناشی از فعالیت‌های ایستا، افزایش کاربرد وسائل نامناسب و مواردی از این دست ریشه در طراحی نامناسب ابزار، وسائل، ساختمان‌ها و محیط‌های کاری دارد [۱]. از آنجایی که طراحی بر اساس داده‌ها و اطلاعات خاصی صورت می‌گیرد

* نویسنده مسئول، آدرس: خراسان رضوی، گناباد، حاشیه جاده آسیابی، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای
تلفن تماس: ۰۵۳۳-۷۲۲۵۰۲۷ - ۰۵۳۳-۷۲۲۳۸۱۴. دورنگار: ۵۳۳-۷۲۲۳۸۱۴. پست الکترونیک: na.sadeghi@gmail.com

استفاده دانشآموزان عامل افزایش خستگی عضلات راست‌کننده ستون فقرات کمری و مالتی‌فیدیوس تعیین شد و محقق اعلام کرد که نتایج پژوهش نشان‌دهنده ضرورت استفاده از نیمکت‌های با ابعاد مناسب برای دانشآموزان است [۱۰].

در اینجا به علت عدم موجود بودن مطالعات روی سایر تجهیزات، مطالعاتی که به روشنی عدم تناسب و عوارض ناشی از آن در مورد میز و صندلی مورد استفاده دانشجویان و دانشآموزان را تأیید کرده‌اند ارائه شد. بی‌شک انجام مطالعات در زمینه اکثر تجهیزات مورد استفاده نتایج مشابهی را در بی‌خواهد داشت. از داده‌های آماری موجود می‌توان بیشتر به اهمیت موضوع پی‌برد. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۳ کل هزینه غرامت پرداخت شده به شاغلین ایالات متحده فقط برای اختلالات اسکلتی ناشی از کار در انداز فوقانی ۵۶۳ میلیون دلار بوده و هزینه شکایت‌های دردهای ناحیه پایین کمر $11/4$ میلیارد دلار برآورده شده است. در ارتباط با استفاده از ابزارهای با طراحی نامناسب، جراحت‌های ایجاد شده در مچ، کف دست و انگشتان $\%23$ کل میانگین روزهای غیبت از کار را به خود اختصاص داده‌اند [۱۱]. در انگلستان هزینه بیماری‌های اسکلتی عضلانی بیشتر از 25 میلیارد پوند برآورده شود [۴].

با توجه به موارد مذکور ضرورت فعالیت در راستای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی منطبق بر جمعیت‌های مختلف ایرانیان احساس می‌شود. از دلایل انتخاب دانشجویان به عنوان گروه هدف، متغیر بودن افراد شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها می‌باشد. دانشجویان در سنی هستند که به لحاظ وضعیت جسمانی از رشد کامل برخوردار بوده و همچنین ترکیبی از تمام قابیل و نژادهای داخلی کشور هستند و از این‌رو می‌توان داده‌های بدست آمده را تا حد قابل قبولی به گروه سنی مذکور در کل کشور تعمیم داد. طراحان ابزار کسانی هستند که بیشترین استفاده را از داده‌های آنتروپومتری می‌برند. مهم‌ترین و سودمندترین هدف آنتروپومتری، تأمین سنجه‌های انسانی است که بتواند تناسب فیزیکی متقابلی بین انسان و هر ماشینی که انسان از آن استفاده می‌کند را ایجاد کند [۱۱].

این واقیت مورد قبول عموم قرار گرفته است که تناسب بینیه بین انسان و وسایط نقلیه، تجهیزات، ساختمان‌ها، کنترل‌ها یا ابزارها، خطاهای را هنگام استفاده از آن‌ها کاهش می‌دهد و باعث کاهش استرس‌های بیومکانیکی می‌شود [۱ و ۴ و ۱۱]. این موارد به نوبه خود منجر به تولید بیشتر، راندمان بالاتر، کاهش حوادث منجر به خسارات مالی،

تفاوت گروه‌ها در ابعاد بدن از فاکتورهای مختلف بیولوژیکی و محیطی متأثر است. فاکتورهای مؤثر بر روی اندازه‌های بدنی عبارتند از: سن، جنس، نژاد، ساختمان بدن، حرفه، رژیم غذایی و فعالیت‌های فیزیکی [۱]. از بین این عوامل، نژاد نقش بسیار مهمی در اختلاف ابعاد بدن افراد دارد [۱ و ۴]. عاقلانه این است که جهت طراحی یک وسیله ابتدا داده‌های معقولی از جمعیت کاربران آن داشته باشیم و آنگاه از این داده‌ها در طراحی ابعاد وسیله استفاده کنیم [۵]. در کشور ما با توجه به عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی در این خصوص که حاوی ابعاد بدن جمعیت ایرانیان باشند تا بتوان از آن‌ها جهت طراحی استفاده نمود بیشتر به اطلاعات موجود در کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا مراجعه می‌شود [۴ و ۶].

در نتیجه این امر اکثر وسایل مورد استفاده ما با ابعاد بدن استفاده کنندگان تناسب ندارند. در نتایج مطالعات صادقی و همکاران این عدم تناسب در ابعاد معلمان آموزشی در کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشان داده شد. بدین صورت که در نتیجه ارتفاع زیاد میزها و فاصله نامناسب آن‌ها از تکیه گاه صندلی دانشجو مجبور است به هنگام یادداشت مطالب روی میز خم شده و حمایت پشتی صندلی را از دست بدهد. در سالن‌های مطالعه خوابگاه نیز این مشکل به خاطر بلند بودن ارتفاع نشیمنگاه صندلی وجود داشت. محققین پیشنهاد نمودند که در استاندارد مربوط به معلمان مراکز آموزشی تجدید نظر شود [۷]. در مطالعه مشابهی که توسط حبیبی و همکاران انجام شده است نیز بین حداقل و حدکثر قابل قبول ابعاد محاسبه شده و موجود میز و نیمکت‌ها اختلاف معناداری وجود داشت. این محققین نتیجه‌گیری کردند که در طراحی میز و نیمکت‌های مناسب برای دانشآموزان، در نظر گرفتن اختلافات آنتروپومتریک ناشی از سن و جنس ضروری است [۸].

ورمزیار و همکارانش در طراحی میز و نیمکت بر اساس ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان دختر دیبرستانی در استان قزوین پس از اندازه گیری ابعاد بدن 240 دانشآموز دختر و تعیین این نکته که تمام ابعاد میز و صندلی مورد استفاده دانشآموزان به جز ارتفاع میز با ابعاد مناسب برای آن‌ها تفاوت دارد، اقدام به طراحی میز و صندلی متناسب با ابعاد بدن آن‌ها نمودند [۹]. طراحی نامناسب وسایل و استفاده طولانی مدت از آن‌ها باعث ایجاد عوارض جسمانی و ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی بسیاری می‌شود. در مطالعه عیسی نژاد و همکاران طراحی نامناسب میز و نیمکت مورد

ارتفاع تکیه‌گاه آرنج - ایستاده: فاصله عمودی از گودی آرنج تا کف پا در حالتی که ساعد و بازوها به طور طبیعی در طرفین بدن آویزان هستند.

ارتفاع بند انگشت - ایستاده: فاصله عمودی از برآمدگی بلندترین انگشت دست تا کف پا در حالتی که کف دست به صورت صاف روی ران قرار دارد. کاربرد: وسایل قابل حمل و نقل، چمدان‌ها، جعبه‌ها، ظرف‌های شیر یا مهمات و ...

ارتفاع زانو: فاصله عمودی از کف تا بالاترین نقطه زانو (نه کاسه زانو یا رأس زانو) در حالتی که شخص عمودی نشسته، زانوها و قوزک‌های پا به صورت عمودی قرار گرفته‌اند.

کاربرد: ساخت و طراحی زیرپائی، زیرمیزی، میز تحریر، دوچرخه، پیشخوان، ...

ارتفاع رکبی: فاصله عمودی از کف تا زیر ران که بلافارسله بعد از زانو قرار می‌گیرد، در حالتی که شخص عمودی نشسته، زانوها و قوزک‌های پا به صورت عمودی قرار گرفته‌اند، انتهای ران‌ها و پشت زانوها با سطح نشستن-گاه تماس دارد. در عمل کف پا سطح نشستنگاه را نگهداری می‌کند، البته شخص باید در وضعیت صحیح قرار گیرد.

اندازه‌گیری با دستگاه آنتروپومتری، کولیس، کالیپر و ترازو انجام شد. داده‌های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۱/۵ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و مقادیر میانگین، انحراف معیار، حداقل، حداکثر و صدک‌های ۵، ۵۰ و ۹۵٪ شاخص‌های آنتروپومتریکی که شامل ۳۰ متغیر می‌باشد محاسبه و جداول مربوطه رسم شد. صدک‌های بدست آمده با استفاده از آزمون آماری Z با مقادیر استاندارد انگلیس و آمریکا مورد مقایسه قرار گرفتند و درصد اختلاف متغیرهای آنتروپومتریکی تعیین شد.

یافته‌ها:

شاخص‌های آماری شامل میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر متغیرهای آنتروپومتریکی دانشجویان در جدول ۱ و صدک‌های ابعاد بدن زنان و مردان ایرانی در مقایسه با صدک‌های استاندارد کشورهای انگلیس و آمریکا در جداول ۲ و ۳ آورده شده‌اند.

کاهش بیماری‌های اسکلتی عضلانی و دیگر بیماری‌های مشابه می‌شوند. هدف نهایی، داشتن بانک اطلاعاتی در زمینه آنتروپومتری است که به متخصصان برای طراحی و ساخت کلیه ابزارها و وسایل بر مبنای استانداردهای داخلی کمک کند و در نهایت به فراهم نمودن محیطی راحت و مناسب در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش اشتباهات و اتفاقات ناخواسته منجر شود [۱۱].

آنتروپومتری از کلمات یونانی آنتروپوس به معنی انسان و مترين به معنی اندازه‌گیری مشتق شده است. آنتروپومتری به عنوان شاخه‌ای از فیزیکال آنتروپولوژی تعریف شده است که به اندازه‌های بدن شامل ابعاد قسمت‌های مختلف، دامنه‌ی حرکت و قدرت عضلات بدن می‌پردازد [۱]. مهندسی آنتروپومتری در غرب بنام فیزیکال آنتروپومتری ثبت شده است و سابقه آن به مارکوپولو باز می‌گردد که در طی سفرهای خود به دور دنیا گزارشی از ابعاد، اندازه‌ها و ساختمان بدنی افراد مختلف به جا گذاشته است. در دنیا تاکنون مطالعات وسیعی در زمینه گردآوری داده‌های آنتروپومتریکی انجام شده است. بیشترین پژوهش‌ها و مطالعات آنتروپومتریکی تاکنون توسط نیروی هوایی امریکا انجام گرفته است و کامل‌ترین مرجع در سال ۱۹۷۸ توسط سازمان هوافضای امریکا منتشر شده است. این مرجع یافته‌های مربوط به ۳۰۶ بعد از ابعاد بدن ۹۱ جمعیت گوناگون در سراسر جهان را در بردارد.

روش کار:

این مطالعه از نوع مقطعی است که به روش مشاهده‌ای انجام شده است و جهت آن آینده‌نگر می‌باشد. جمعیت مورد مطالعه را دانشجویان دختر و پسر ۲۰-۳۰ ساله دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل می‌دهند. بر اساس حدود اطمینان ۹۵ درصد حجم نمونه، ۳۸۴ نفر مرد و ۳۸۴ نفر زن انتخاب شدند. روش نمونه-گیری تصادفی کلاسیک بوده و نمونه‌ها از لیست دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده‌های مختلف با توجه به شماره دانشجویی انتخاب شدند. در ادامه برخی از پارامترهای آنتروپومتریکی مورد اندازه‌گیری معرفی می‌شوند:

ارتفاع چشم - ایستاده: فاصله عمودی از زاویه داخلی چشم تا کف پا در حالتی که شخص مستقیم به جلو نگاه می‌کند.

جدول ۱: شاخص‌های آماری داده‌های آنتروپومتریکی دانشجویان دختر و پسر ایرانی

متغیر آنتروپومتریکی	دانشجویان پسر								دانشجویان دختر							
	تعداد	میانگین	انحراف معیار	حداقل	حداکثر	تعداد	میانگین	انحراف معیار	حداقل	حداکثر	تعداد	میانگین	انحراف معیار	حداقل	حداکثر	
۱- وزن																
۲- قد - ایستاده	۳۸۴	۶۹	۱۱/۵۹	۴۳	۱۱۲	۳۸۴	۵۶	۷/۹۸	۳۷/۵	۸۵	۳۸۴	۵/۴۵	۱۴۳/۵	۱۷۶/۵	۲۰۰	۱۴۲/۵
۳- ارتفاع شانه - ایستاده	۳۸۴	۱۴۵/۷	۶/۷۸	۱۲۷/۵	۱۶۵	۳۸۴	۱۳۲	۷/۹۵	۱۲۴	۱۶۱/۴	۳۸۴	۱۴۹/۲	۵/۷۱	۱۳۰/۵	۱۶۶/۵	
۴- ارتفاع چشم - ایستاده	۳۸۴	۱۶۲/۴۶	۷/۴۹	۱۴۰/۵	۱۸۷	۳۸۴	۱۳۵/۵	۹۸/۸	۴/۶۰	۱۲۱/۷	۳۸۴	۱۰۸/۲	۵/۶۷	۱۰۸/۲	۱۲۱/۷	
۵- ارتفاع تکیه گاه آرنج - ایستاده	۳۸۴	۷۶/۳	۴/۰۶	۵/۶۸	۱۱۹/۵	۳۸۴	۸۸	۵۹	۳۸۴	۹۱/۵	۳۸۴	۶۴/۳	۳/۶۴	۵۲/۵	۱۱۲/۳	
۶- ارتفاع بند انگشت - ایستاده	۳۸۴	۱۳۲/۷	۵/۶۸	۱۱۹/۵	۱۶۱/۵	۳۸۴	۱۲۷	۳/۲۸	۱۱۲/۳	۱۳۷/۲	۳۸۴	۱۱۶	۳/۳۷	۱۰۰/۸	۱۳۸/۵	
۷- طول بازو - ایستاده	۳۸۴	۸۲/۸	۴/۲۲	۷۱	۹۹/۵	۳۸۴	۷۴/۳	۳/۵۲	۶۵/۵	۸۴	۳۸۴	۸۰/۸	۴/۶۰	۱۲۱/۷	۱۲۱/۷	
۸- قد - نشسته	۳۸۴	۱۲۰/۲	۵/۹۷	۱۰۰	۱۴۷/۵	۳۸۴	۱۱۶	۳/۳۷	۱۰۰/۸	۱۳۸/۵	۳۸۴	۱۰۳/۴	۵/۵۵	۹۱/۶	۱۱۵/۵	
۹- ارتفاع چشم - نشسته	۳۸۴	۱۲۰/۲	۳/۲۱	۱۰۰	۱۴۷/۵	۳۸۴	۱۱۶	۳/۳۷	۱۰۰/۸	۱۳۸/۵	۳۸۴	۱۰۳/۴	۳/۲۵	۲۵	۴۵/۳	
۱۰- ارتفاع شانه نشسته	۳۸۴	۳۸/۵	۳/۲۱	۱۰۰	۱۴۷/۵	۳۸۴	۱۲۵/۵	۸۲/۵	۳/۴۷	۲۵	۳۸۴	۹۶/۳	۲/۹۲	۲/۹۲	۱۱۵/۵	
۱۱- طول شانه - آرنج	۳۸۴	۸۱/۸	۴/۲۲	۷۰	۹۸/۵	۳۸۴	۷۲/۴	۴/۲۲	۶۰/۳	۶۵	۳۸۴	۷۰/۰	۳/۱۳	۴۵/۱	۴۵/۱	
۱۲- طول شانه - نوک انگشت	۳۸۴	۶۰/۶	۳/۲۱	۷۰	۹۸/۵	۳۸۴	۵۳/۸	۳/۱۳	۴۵/۱	۶۵	۳۸۴	۵۳/۸	۲/۸۳	۴۰/۵	۵۶	
۱۳- طول زانو	۳۸۴	۴۲/۶	۲/۶۸	۲۳	۵۲/۵	۳۸۴	۴۰/۹	۲/۲۰	۳۵	۵۵/۵	۳۸۴	۴۰/۹	۲/۲۰	۳/۱۳	۴۵/۱	
۱۴- ارتفاع زانو	۳۸۴	۸۴/۸	۴/۲۲	۷۳	۱۰۱/۵	۳۸۴	۷۴/۱	۳/۸۰	۵۳	۹۸/۸	۳۸۴	۸۴/۸	۳/۸۰	۳/۲۸	۵۳	
۱۵- ارتفاع رکبی	۳۸۴	۴۲/۶	۲/۶۸	۲۳	۱۰۱/۵	۳۸۴	۷۴/۱	۳/۸۰	۵۳	۹۸/۸	۳۸۴	۸۴/۸	۳/۸۰	۳/۲۸	۵۳	
۱۶- طول بازو - نشسته	۳۸۴	۱۳۲/۷	۵/۶۸	۱۱۹/۵	۱۶۱/۵	۳۸۴	۱۲۷	۳/۲۸	۱۱۲/۳	۱۳۷/۲	۳۸۴	۱۳۲/۷	۵/۶۸	۱۱۲/۳	۱۳۷/۲	
۱۷- پهنهای نشیمنگاه	۳۸۴	۳۶/۸	۳/۴۷	۲۸	۶۴/۵	۳۸۴	۳۶/۵	۲/۵۱	۲۴/۵	۴۴/۵	۳۸۴	۳۶/۸	۳/۱۶	۴۳/۴	۴۳/۵	
۱۸- ارتفاع تکیه گاه آرنج - نشسته	۳۸۴	۶۵/۱	۴/۶۵	۵۵	۸۵/۵	۳۸۴	۶۵/۵	۲/۶۳	۵۸	۷۳/۵	۳۸۴	۶۵/۱	۲/۶۳	۵۸	۷۳/۵	
۱۹- طول ساعد	۳۸۴	۴۷/۵	۲/۹۵	۴۰	۶۰	۳۸۴	۳۸/۶	۳/۲۶	۲۹/۱	۴۹/۱	۳۸۴	۴۷/۵	۲/۹۵	۳/۲۶	۲۹/۱	
۲۰- طول باسن - رکبی	۳۸۴	۵۰/۲	۳/۴۹	۴۰/۵	۵۹	۳۸۴	۴۳/۴	۳/۱۶	۳۱/۵	۵۸/۵	۳۸۴	۵۰/۲	۳/۱۶	۳/۱۶	۳۱/۵	
۲۱- طول کف پا	۳۸۴	۲۵/۷	۱/۳۶	۲۲	۳۰	۳۸۴	۲۲/۸	۱/۲۶	۲۹/۹	۲۹/۹	۳۸۴	۲۵/۷	۱/۳۶	۱/۲۶	۲۹/۹	
۲۲- پهنهای کف پا	۳۸۴	۹/۴	۰/۷۵	۶/۵	۱۱/۵	۳۸۴	۸/۶	۰/۶۶	۶/۹	۱۰/۴	۳۸۴	۹/۴	۰/۷۵	۰/۶۶	۶/۹	
۲۳- پهنهای شانه	۳۸۴	۴۵	۳/۱۲	۳۸	۵۸	۳۸۴	۳۸/۱	۲/۴۲	۲۰	۴۵	۳۸۴	۴۵	۳/۱۲	۳/۱۶	۲۰	
۲۴- عمق سینه	۳۸۴	۲۲/۸	۲/۱۷	۱۷/۵	۳۰/۵	۳۸۴	۲۱/۶	۲/۴۳	۱۵	۳۱	۳۸۴	۲۲/۸	۲/۱۷	۲/۱۷	۱۵	
۲۵- پهنهای سینه	۳۸۴	۲۹/۷	۲/۵۸	۲۲	۴۱	۳۸۴	۲۶	۲/۲۳	۱۹/۵	۳۹/۵	۳۸۴	۲۹/۷	۲/۵۸	۲/۲۳	۱۹/۵	
۲۶- طول سر	۳۸۴	۲۰/۲	۱/۱۸	۱۵/۵	۲۳	۳۸۴	۲۱/۳	۱/۱۴	۱۸/۵	۳۱/۴	۳۸۴	۲۰/۲	۱/۱۸	۱/۱۴	۱۸/۵	
۲۷- دور سینه	۳۸۴	۹۱/۶	۷/۴۵	۷۴	۱۱۸	۳۸۴	۸۶/۶	۶/۵۳	۷۲	۱۱۲	۳۸۴	۹۱/۶	۷/۴۵	۶/۵۳	۷۲	
۲۸- دور سینه در زیر بغل	۳۸۴	۹۴/۳	۷/۶۷	۷۷/۵	۱۲۲	۳۸۴	۸۰/۶	۵/۰۳	۵۹	۹۸	۳۸۴	۹۴/۳	۷/۶۷	۵/۰۳	۵۹	
۲۹- دور کمر	۳۸۴	۸۰/۵	۸/۲۷	۶۵	۱۰۸	۳۸۴	۶۸/۳	۶/۲۹	۵۱	۹۲/۴	۳۸۴	۸۰/۵	۸/۲۷	۶/۲۹	۵۱	
۳۰- عمق ران	۳۸۴	۱۶/۲	۱/۸۱	۱۱	۲۴/۵	۳۸۴	۱۳/۵	۱/۸۶	۸	۲۹	۳۸۴	۱۶/۲	۱/۸۱	۱/۸۶	۸	

جدول ۲: صدکهای ابعاد آنتروپومتریکی زنان ایرانی در مقایسه با صدکهای استاندارد زنان انگلیسی و آمریکایی

متغیر آنتروپومتریکی	صدکهای زنان ایرانی					صدکهای استاندارد زنان آمریکا				
	صدکهای استاندارد زنان انگلیس	صدکهای استاندارد زنان ایرانی	صدکهای استاندارد زنان آمریکا	صدکهای استاندارد زنان انگلیس	صدکهای استاندارد زنان ایرانی	صدکهای استاندارد زنان آمریکا	صدکهای استاندارد زنان انگلیس	صدکهای استاندارد زنان ایرانی	صدکهای استاندارد زنان آمریکا	
- وزن	--	--	--	۸۲	۶۲	۴۲	۷۱/۳	۵۵/۵	۴۴	
- قد - ایستاده	۱۷۳	۱۶۲/۵	۱۵۲	۱۷۲	۱۶۲	۱۵۲	۱۶۹/۲	۱۶۰/۶	۱۵۰/۷	
- ارتفاع شانه - ایستاده	۱۴۲/۵	۱۳۲/۵	۱۲۲/۵	۱۴۱	۱۳۲	۱۲۲/۵	۱۴۱/۳	۱۳۲	۱۲۳/۱	
- ارتفاع چشم - ایستاده	۱۶۳	۱۵۲/۵	۱۴۲	۱۶۱/۵	۱۵۱/۵	۱۴۱/۵	۱۵۸/۵	۱۴۹/۵	۱۴۰/۱	
- ارتفاع تکیه گاه آرنج - ایستاده	۱۰۹/۵	۱۰۲	۹۴/۵	۱۰۹	۱۰۱/۵	۹۴	۱۰۵/۵	۹۸/۵	۹۱/۵	
- ارتفاع بند انگشت - ایستاده	۷۹	۷۳	۶۷	۷۸/۵	۷۲/۵	۶۶/۵	۶۹/۵	۶۴/۱	۵۹	
- طول بازو - ایستاده	۸۳/۵	۷۷	۷۰/۵	۸۲/۵	۷۶	۷۰/۵	۸۰/۵	۷۴/۳	۶۸/۷	
- قد - نشسته	۱۳۷	۱۲۶/۵	۱۱۶	۱۳۶	۱۲۵/۵	۱۱۱/۵	۱۳۲	۱۲۷	۱۲۱/۵	
- ارتفاع چشم - نشسته	۱۲۶	۱۱۵/۵	۱۰۵	۱۲۴/۵	۱۱۴/۵	۱۰۴/۵	۱۲۱	۱۱۶	۱۱۱/۲	
- ارتفاع شانه نشسته	۱۰۷	۹۷	۸۷	۱۰۵/۵	۹۶	۸۶/۵	۱۰۴	۹۹/۲	۹۴/۵	
- طول شانه - آرنج	۳۶/۵	۳۳/۵	۳۰/۵	۳۶	۳۳	۳۰/۵	۳۷/۸	۳۳/۷	۳۰	
- طول شانه - نوک انگشت	۸۳/۵	۷۷	۷۰/۵	۸۲/۵	۷۶	۷۰/۵	۷۹/۵	۷۲/۵	۶۵/۷	
- طول زانو	۶۲/۵	۵۷/۵	۲۵/۵	۶۱/۵	۶۵/۵	۵۲	۵۹	۵۳/۷	۴۹/۲	
- ارتفاع زانو	۵۵	۵۰/۵	۴۶	۵۴/۵	۵۰	۴۶	۵۳	۴۸	۴۳	
- ارتفاع رکبی	۴۵	۴۰/۵	۳۶	۴۴/۵	۴۰	۳۵/۵	۴۴/۸	۴۰/۵	۳۸	
- طول بازو - نشسته	۸۲/۵	۷۷	۷۰/۵	۸۲/۵	۷۶	۷۰/۵	۸۰/۵	۷۴	۶۸/۷	
- پهنهای نشیمنگاه	۴۴	۳۷/۵	۳۱	۴۰	۳۵	۳۰	۴۰/۹	۳۶/۴	۳۲/۷	
- ارتفاع آرنج - نشسته	۷۲/۵	۶۴	۵۴/۵	۷۲	۶۳	۵۳/۵	۷۰	۶۵/۵	۶۱/۵	
- طول ساعد	۴۷	۴۳/۵	۴۴	۴۶/۵	۴۳	۴۰	۴۴/۳	۳۸/۵	۳۳/۳	
- طول باسن - رکبی	۵۴	۴۹	۴۰	۵۲/۵	۴۷/۵	۴۳	۴۸/۶	۴۳/۵	۳۹/۵	
- طول کف پا	۲۶	۲۴	۲۲	۲۶	۲۴	۲۲	۲۴/۸	۲۲/۸	۲۱	
- پهنهای کف پا	۱۰	۹	۸	۱۰	۹	۸	۹/۷	۸/۶	۷/۵	
- پهنهای شانه	۴۴	۴۰	۳۶	۴۳/۵	۳۹/۵	۵۳/۵	۴۱/۶	۳۸/۳	۳۴/۹	
- عمق سینه	۳۰	۲۵/۵	۲۱	۲۷/۵	۲۳/۵	۱۹	۲۵/۵	۲۱/۵	۱۸	
- پهنهای سینه	--	--	--	۲۷/۹	۲۵/۳	۲۲/۷	۲۹/۳	۲۵/۸	۲۳/۳	
- طول سر	--	--	--	۲۲	۲۰/۵	۱۹	۲۲/۸	۲۱/۵	۱۹/۶	
- دور سینه	--	--	--	۹۰/۵	۸۲/۳	۷۴/۱	۹۹	۸۶	۷۷	
- دور سینه در زیر بغل	--	--	--	۱۰۱/۶	۹۰/۳	--	۸۹/۵	۸۰/۵	۷۳/۰۵	
- دور کمر	--	--	--	۷۹/۷	۶۸/۲	۵۶/۷	۷۹	۶۸	۵۹/۷	
- عمق ران	--	--	--	۱۷	۱۴/۴	۱۱/۸	۱۶/۵	۱۳/۵	۱۱	

جدول ۳: صدک‌های ابعاد آنתרופومتریکی مردان ایرانی در مقایسه با صدک‌های استاندارد مردان انگلیسی و آمریکایی

متغیر آنתרופومتریکی	صدک‌های مردان ایرانی					صدک‌های استاندارد مردان انگلیس					صدک‌های استاندارد مردان آمریکا		
	۹۵	۵۰	۵	۹۵	۵۰	۵	۹۵	۵۰	۵	۹۵	۵۰	۵	۹۵
۱- وزن	--	--	--	۹۴	۷۴	۵۴	۸۸/۷	۶۸	۵۳	--	--	--	--
۲- قد - ایستاده	۱۸۷	۱۷۵/۵	۱۶۴	۱۸۸	۱۷۶	۱۶۴	۱۸۷/۸	۱۷۵	۱۶۴	۱۸۷	۱۷۵	۱۶۴	۱۸۷/۵
۳- ارتفاع شانه - ایستاده	۱۵۵	۱۴۴	۱۳۳	۱۵۵/۵	۱۴۴/۵	۱۳۳	۱۵۸/۵	۱۴۶	۱۳۶/۱	۱۵۵	۱۴۴	۱۳۳	۱۵۵/۵
۴- ارتفاع چشم - ایستاده	۱۸۲/۵	۱۷۱	۱۵۹/۵	۱۷۷	۱۶۵	۱۵۳	۱۷۵/۳	۱۶۲/۵	۱۵۱	۱۸۲/۵	۱۷۱	۱۵۱	۱۸۲/۵
۵- ارتفاع تکیه گاه آرنج - ایستاده	۱۱۹	۱۱۰/۵	۱۰۲	۱۱۹/۵	۱۱۰/۵	۱۰۲	۱۱۸/۵	۱۰۸	۱۰۰	۱۱۹	۱۱۰/۵	۱۰۰	۱۱۹/۵
۶- ارتفاع بند انگشت - ایستاده	۸۳	۷۶/۵	۷۰	۸۳/۵	۷۶/۵	۶۹/۵	۸۳/۵	۷۶	۷۰	۸۳	۷۶/۵	۷۰	۸۳
۷- طول بازو - ایستاده	۹۱/۵	۸۴/۵	۷۷/۵	۹۲/۵	۸۵	۷۸	۹۰	۸۳	۷۷	۹۱/۵	۸۴/۵	۷۷	۹۱/۵
۸- قد - نشسته	۱۳۲	۱۳۶	۱۲۵	۱۴۷/۵	۱۳۶	۱۲۸/۵	۱۴۲	۱۳۳	۱۲۳/۶	۱۳۲	۱۳۶	۱۲۳/۶	۱۳۲
۹- ارتفاع چشم - نشسته	۱۳۵/۵	۱۲۴/۵	۱۱۳/۵	۱۳۵/۵	۱۲۴	۱۱۴	۱۲۹/۵	۱۲۰	۱۱۰/۵	۱۳۵/۵	۱۲۴/۵	۱۱۰/۵	۱۳۵/۵
۱۰- ارتفاع شانه نشسته	۱۱۵	۱۰۴/۵	۹۴	۱۱۵	۱۰۴/۵	۹۴/۵	۱۱۲/۸	۱۰۳	۹۵/۵	۱۱۵	۱۰۴/۵	۹۵/۵	۱۱۵
۱۱- طول شانه - آرنج	۴۰	۳۶/۵	۳۳	۴۰/۵	۳۷	۳۳/۵	۴۳	۳۹	۳۴	۴۰	۳۶/۵	۳۴	۴۰
۱۲- طول شانه - نوک انگشت	۹۱/۵	۸۴/۵	۷۷/۵	۹۲/۵	۸۵	۷۸	۸۹	۸۲	۷۶	۹۱/۵	۸۴/۵	۷۶	۹۱/۵
۱۳- طول زانو	۶۵	۶۰	۵۵	۶۵	۵۹/۵	۵۴/۵	۶۷/۵	۶۰	۵۵	۶۵	۶۰	۵۵	۶۵
۱۴- ارتفاع زانو	۶۰/۵	۵۵	۴۹/۵	۶۰/۵	۵۵	۴۹/۵	۶۰	۵۳/۵	۵۰	۶۰/۵	۵۵	۵۰	۶۰/۵
۱۵- ارتفاع رکبی	۴۹/۵	۴۴/۵	۳۹/۵	۴۹/۵	۴۴/۵	۴۰	۴۸	۴۲/۵	۳۸/۶	۴۹/۵	۴۴/۵	۴۲/۵	۴۹/۵
۱۶- طول بازو - نشسته	۹۱/۵	۸۴/۵	۷۷/۵	۹۲/۵	۸۵	۷۸	۹۲	۸۵	۷۹	۹۱/۵	۸۴/۵	۷۹	۹۱/۵
۱۷- پهنهای نشیمنگاه	۴۱	۳۶	۳۱	۴۰	۳۵	۳۰	۴۱	۳۶/۵	۳۲/۵	۴۱	۳۶	۳۲/۵	۴۱
۱۸- ارتفاع تکیه گاه آرنج - نشسته	۷۹	۶۹	۵۹	۷۹/۵	۶۹	۵۹/۵	۷۲/۵	۶۵	۵۷/۵	۷۹	۶۹	۵۷/۵	۷۹
۱۹- طول ساعد	۵۱/۵	۴۸	۴۴/۵	۵۱/۵	۴۸	۴۴/۵	۵۲/۵	۴۷/۵	۴۳	۵۱/۵	۴۸	۴۳	۵۱/۵
۲۰- طول باسن - رکبی	۵۵/۵	۵۰	۴۴/۵	۵۵/۵	۵۰	۴۴/۵	۵۶/۵	۵۰	۴۴/۵	۵۵/۵	۵۰	۴۴/۵	۵۵/۵
۲۱- طول کف پا	۲۹	۲۶/۵	۲۴	۲۹	۲۷	۲۴/۵	۲۸/۵	۲۵/۵	۲۴	۲۹	۲۶/۵	۲۴	۲۹
۲۲- پهنهای کف پا	۱۱	۱۰	۹	۱۱	۱۰	۹	۱۰/۵	۹/۵	۸	۱۱	۱۰	۹	۱۱
۲۳- پهنهای شانه	۵۱/۵	۴۷	۴۲/۵	۵۱	۴۶/۵	۴۱/۵	۵۰/۳	۴۵	۴۱	۵۱/۵	۴۷	۴۱	۵۱/۵
۲۴- عمق سینه	۲۹	۲۵/۵	۲۲	۲۷	۲۲/۵	۱۸/۵	۲۷	۲۲/۵	۲۰	۲۹	۲۵/۵	۲۰	۲۹
۲۵- پهنهای سینه	--	--	--	۳۵/۳	۳۱/۵	۲۸/۱	۳۴/۵	۲۹/۵	۲۶	--	--	--	--
۲۶- طول سر	--	--	--	۲۳/۶	۲۲/۱	۲۰/۶	۲۲	۲۰	۱۸	--	--	--	--
۲۷- دور سینه	--	--	--	۱۰/۱/۶	۹۲/۵	۸۳/۲	۱۰/۵/۳	۹۱	۸۱	--	--	--	--
۲۸- دور سینه در زیر بغل	--	--	--	--	--	--	۱۰/۹	۹۴	۸۳	--	--	--	--
۲۹- دور کمر	--	--	--	۹۵/۳	۸۲/۷	۷۰/۱	۹۵	۸۰	۶۸	--	--	--	--
۳۰- عمق ران	--	--	--	۱۷/۶	۱۵/۳	۱۳	۱۷/۶	۱۵/۳	۱۳	--	--	--	--

وزن دانشجویان دختر برای صدک‌های ۵، ۵۰ و ۹۵ اختلاف معناداری را نشان داد ($P<0.05$).

قد: مقایسه متغیر قد دانشجویان پسر نشان داد که صدک‌های ۵ و ۹۵ در مقایسه با استانداردهای انگلیسی و آمریکا دارای اختلاف معنادار نبودند ($P>0.05$). این مقایسه برای دانشجویان دختر مشخص کرد که صدک‌های ۵ و ۹۵ متغیر قد نسبت به استانداردهای انگلیسی و آمریکا اختلاف معناداری دارند ($P<0.05$).

نتایج مقایسه صدک‌های ایرانی با صدک‌های انگلیسی و آمریکایی توسط آزمون Z به صورت زیر می‌باشد:

وزن: در مقایسه متغیر وزن با استاندارد انگلیس مشخص شد که صدک ۵ متغیر وزن دانشجویان پسر بدست آمده از این مطالعه دارای اختلاف معناداری با صدک ۵ استاندارد نبود ($P>0.05$) در حالی که صدک‌های ۵۰ و ۹۵ وزن دانشجویان پسر در مقایسه با استاندارد آمریکا اختلاف معناداری را نشان داد ($P<0.05$). این مقایسه برای متغیر

ارتفاع چشم - نشسته: هر سه صدک مربوط به این متغیر در دانشجویان پسر و دختر در مقایسه با استانداردهای انگلیس و آمریکا دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$).
۱۰

ارتفاع شانه - نشسته: در مقایسه این متغیر با استاندارد انگلیس نشان داد که صدک‌های ۵۰ و ۹۵ دانشجویان پسر و صدک‌های ۵ و ۹۵ دانشجویان دختر دارای اختلاف بودند ($P<0.05$) و در مقایسه با استاندارد آمریکا مشخص شد که هر سه صدک در دانشجویان پسر و صدک‌های ۵ و ۹۵ در دانشجویان دختر دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$).
۱۱

طول شانه - آرنج: صدک‌های ۵۰ و ۹۵ این متغیر در پسرها و صدک ۵ و ۹۵ در دخترها در مقایسه با استاندارد انگلیس دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$). همچنین مقایسه این متغیر با استاندارد آمریکا نشان داد که هر سه صدک پسرها و صدک ۵ و ۹۵ دخترها دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$).
۱۲

طول شانه - نوک انگشتان: صدک‌های ۵۰ و ۹۵ این متغیر در پسرها و هر سه صدک در دخترها در مقایسه با استاندارد انگلیس دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$). همچنین مقایسه این متغیر با استاندارد آمریکا نشان داد که سه صدک پسرها و دخترها دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$).
۱۳

طول زانو: در دانشجویان پسر و دختر هر سه صدک مربوط به این متغیر در مقایسه با استاندارد انگلیس و صدک‌های ۹۵ پسرها و هر سه صدک دخترها در مقایسه با استاندارد آمریکا اختلاف معناداری را نشان دادند ($P<0.05$).
۱۴

ارتفاع زانو: مقایسه این متغیر با استاندارد انگلیس اختلاف معناداری را در صدک ۵۰ پسرها و هر سه صدک دخترها نشان داد ($P<0.05$), در حالی که در مقایسه با استاندارد آمریکا هر سه صدک در هر دو جنس دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$).
۱۵

ارتفاع رکبی: مقایسه این متغیر با استاندارد انگلیس در دانشجویان پسر و دختر هر سه صدک و در مقایسه با استاندارد آمریکا سه صدک پسرها و صدک ۵ دخترها دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$).
۱۶

طول بازو - نشسته: صدک‌های ۵ و ۹۵ پسرها و هر سه صدک این متغیر در دخترها در مقایسه با استاندارد انگلیس دارای اختلاف بودند ($P<0.05$) و در مقایسه با استاندارد آمریکا هر سه صدک پسرها و صدک‌های ۵۰ و ۹۵ اختلاف معناداری را نشان دادند ($P<0.05$).
۱۷

پهنای نشیمنگاه: مقایسه این متغیر با استاندارد انگلیس نشان داد که هر سه صدک در هر دو جنس دارای مقدار

ارتفاع شانه - ایستاده: مقایسه صدک‌های این متغیر با استاندارد انگلیس برای دانشجویان پسر اختلاف معناداری را برای صدک‌های ۵، ۵۰ و ۹۵ نشان داد و در مقایسه با استاندارد آمریکا هم نتیجه مشابه حاصل شد ($P<0.05$).
۱۸

ارتفاع چشم - ایستاده: این متغیر در مقایسه با استاندارد انگلیس در دانشجویان پسر صدک‌های ۵ و ۵۰ و در دانشجویان دختر صدک‌های ۵ و ۹۵ اختلاف معناداری داشتند ($P<0.05$) و در مقایسه با استاندارد آمریکا مشخص شد که هر ۳ صدک در دانشجویان پسر و دختر دارای اختلاف معناداری هستند ($P<0.05$).
۱۹

ارتفاع آرنج - ایستاده: مقایسه صدک‌های این متغیر با استاندارد انگلیس نشان داد که در دانشجویان پسر صدک‌های ۵ و ۹۵ در دانشجویان دختر هر سه صدک اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$), در حالی که در مقایسه با استاندارد آمریکا مشخص شد که برای صدک‌های ۵ و ۵۰ متغیر ارتفاع آرنج ایستاده دانشجویان پسر و هر سه صدک در دانشجویان دختر اختلاف معنادار شدند ($P<0.05$).
۲۰

ارتفاع بند انگشت - ایستاده: مقایسه این متغیر با استاندارد انگلیس نشان داد که صدک‌های ۵ و ۵۰ دانشجویان پسر و صدک‌های ۵، ۵۰ و ۹۵ دانشجویان دختر دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$), در حالی که در مقایسه با استاندارد آمریکا صدک‌های ۵۰ و ۹۵ متغیر دانشجویان پسر و هر سه صدک دانشجویان دختر این اختلاف را معنادار نشان دادند ($P<0.05$).
۲۱

طول بازو - ایستاده: صدک‌های ۵، ۵۰ و ۹۵ این متغیر در دانشجویان پسر و دختر در مقایسه با استاندارد انگلیس دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$), در حالی که در مقایسه با استاندارد آمریکا صدک‌های ۵۰ و ۹۵ متغیر طول بازو ایستاده در دانشجویان پسر و هر سه صدک در دانشجویان دختر اختلاف معناداری را نشان دادند ($P<0.05$).
۲۲

ارتفاع نشسته: مقایسه صدک‌های این متغیر با استاندارد انگلیس نشان داد که در دانشجویان پسر و دختر هر سه صدک دانشجویان دختر دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$) و در مقایسه با استاندارد آمریکا صدک ۵۰ این متغیر در دانشجویان پسر و صدک‌های ۵، ۵۰ و ۹۵ در دانشجویان دختر دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$).
۲۳

پهنهای سینه: مقایسه صدک‌های بدست آمده از این پژوهش برای متغیر پهنهای سینه مشخص کرد که صدک ۵۰ در پسرها با مقادیر استاندارد انگلیس یکسان است و بقیه صدک‌ها اختلاف معناداری را نسبت به این استاندارد نشان دادند ($P<0.05$).

طول سر: مقایسه این متغیر با استاندارد انگلیس نشان داد که اندازه طول سر در افراد ایرانی نسبت به افراد انگلیسی متفاوت است ($P<0.05$). این متغیر در هر سه صدک برای هر دو جنس اختلاف معناداری را نشان داد ($P<0.05$).

دور سینه: متغیر دور سینه دانشجویان دختر در هر سه صدک نسبت به استاندارد انگلیس دارای مقادیر متفاوت می‌باشد ($P<0.05$).

دور سینه در زیر بغل: مقایسه صدک‌های این متغیر با استاندارد انگلیس نشان داد که هر سه صدک در هر دو جنس دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$).

دور گمر: مقایسه صدک‌های این متغیر با استاندارد انگلیس اختلاف معناداری را در صدک ۹۵ دانشجویان پسر و صدک ۵۰ دانشجویان دختر نشان داد ($P<0.05$).

عمق ران: در این پژوهش صدک‌های ۵، ۵۰ و ۹۵ متغیر عمق ران با مقادیر انگلیس نشان داد که فقط صدک ۵ پسرها دارای مقادیر یکسان می‌باشند و در بقیه صدک‌ها برای هر دو جنس این متغیر اختلاف معناداری را نسبت به مقادیر انگلیس نشان داد ($P<0.05$).

بحث:

تحقیقاتی که تاکنون در زمینه آنתרופومتری انجام شده است محدود بوده و لازم است مطالعات بیشتری در سطح گسترده‌ در جمیعت‌های گوناگون به لحاظ سن و جنس و همچنین در مورد تناسب تجهیزات مختلف انجام شود تا نتایج همه آن‌ها اطلاعات دقیق‌تری از جامعه ایرانی ارائه دهد. تاکنون هیچ مطالعه مشابهی با مطالعه حاضر در کشور انجام نشده است تا بتوان اندازه‌های آنתרופومتریک ایرانیان را با دیگر کشورها مقایسه کرد، فقط در مطالعه جنیدی و صادقی در بررسی ابعاد آنתרופومتریکی ایستانی کارگران ۳۷۱۶-۲۰ ساله شش قومیت ایرانی، اطلاعات مربوط به کارگر از نژادهای مختلف ایران جمع‌آوری شده است که تفاوت معناداری بین داده‌های آنthropometric کارگران دو جنس به ویژه در قد و وزن آن‌ها گزارش شده است که با نتایج مطالعه حاضر مشابه است. در مطالعه حاضر نیز اکثر اندازه‌ها در مردان بیشتر از زنان است به جز پهنهای نشستن

متفاوت بودند ($P<0.05$). همچنین صدک ۹۵ پسرها و صدک‌های ۵۰ و ۹۵ دانشجویان دختر در مقایسه با استاندارد امریکا دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$).

ارتفاع آرچ-فشنسته: در دانشجویان پسر و دختر هر سه صدک نسبت به مقادیر استاندارد انگلیس دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$). همچنین در مقایسه با استاندارد آمریکا سه صدک پسرها و صدک‌های ۵ و ۹۵ دخترها اختلاف معناداری را نشان دادند ($P<0.05$).

طول ساعد: مقایسه صدک‌های ۵، ۵۰ و ۹۵ متغیر طول ساعد در مقایسه با استاندارد انگلیس نشان داد که صدک‌های ۵ و ۹۵ پسرها و هر سه صدک دخترها و در مقایسه با استاندارد آمریکا هر سه صدک در هر دو جنس دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$).

طول باسن-رگبی: مقایسه این متغیر با استاندارد انگلیس مشخص کرد که صدک‌های ۵۰ و ۹۵ در دانشجویان پسر و هر سه صدک در دانشجویان دختر دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$). این اختلاف همچنین در صدک‌های ۵۰ و ۹۵ پسرها و هر سه صدک در دخترها نسبت به مقادیر استاندارد آمریکا معنادار بودند ($P<0.05$).

طول کف پا: صدک‌های ۵، ۵۰ و ۹۵ این متغیر در مقایسه با استاندارد انگلیس برای هر دو جنس و صدک‌های ۵۰ و ۹۵ پسرها و هر سه صدک در دخترها در مقایسه با استاندارد آمریکا دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$).

پهنهای کف پا: مقایسه صدک‌های این متغیر با استانداردهای انگلیس و آمریکا نشان داد که این متغیر در هر دو جنس دارای اختلاف معنادار هستند ($P<0.05$). بنابراین اندازه پهنهای پا در افراد ایرانی در مقایسه با افراد انگلیسی و آمریکایی دارای مقدار متفاوت می‌باشد.

پهنهای شانه: صدک ۵۰ پسرها و صدک ۵ دخترها برای این متغیر در مقایسه با مقادیر انگلیس یکسان بودند و بقیه صدک‌ها اختلاف معناداری را نشان دادند ($P<0.05$). در حالی که در مقایسه با مقادیر استاندارد آمریکا هر سه صدک پسرها و صدک‌های ۵۰ و ۹۵ دخترها دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$).

عمق سینه: مقایسه صدک‌های ۵، ۵۰ و ۹۵ عمق سینه با صدک‌های انگلیس و آمریکا نشان داد که این متغیر برای هر سه صدک در دو جنس دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$). بنابراین از اندازه‌های انگلیسی و آمریکایی این متغیر جهت طراحی وسایل مورد نیاز افراد ایرانی نمی‌توان استفاده کرد.

نیروهای نظامی را پیشنهاد نمودند [۱۷]. لایوس و همکارش در ارزیابی ارگونومیک و طراحی مجدد دوچرخه کودکان بر اساس داده‌های آنتروپومتریک پیشنهاد کردند که دوچرخه‌های اصلاح شده متناسب با گروه‌های خاص تولید شوند [۱۸].

لازم به ذکر است که در زمان انجام مطالعه حاضر، طرح مشابهی به مرحله‌ی اجرا در نیامده بود اما در سال ۱۳۸۷ طرحی جامع با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در خصوص جمع آوری داده‌های آنتروپومتریکی دانشآموزان در رده‌های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان انجام شده است که داده‌های آن تا جایی که نویسنده‌گان این مقاله اطلاع دارند، هنوز منتشر نشده است.

نتیجه‌گیری: به طور کلی، پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد بدنی افراد ایرانی با صدک‌های استاندارد افراد انگلیسی و آمریکایی متفاوت می‌باشد و بنابراین در طراحی و ساخت ابزارها نمی‌توان از اطلاعات و داده‌های آنtronopometric که کشورها استفاده کرد. داده‌های این پژوهش مجموعه‌ای از داده‌های آنتروپومتریکی مربوط به دانشجویان ایرانی است که به همراه نتایج مطالعات مشابه از جمله مطالعه جنیدی و مرتضوی و مطالعات مشابه دیگری که لازم است در جمعیت‌های ایرانی انجام شود می‌تواند در ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و در طراحی و ساخت کلیه ابزارها و وسائل مورد نیاز جوامع ایرانی استفاده شود. پیشنهاد می‌شود مطالعات آنتروپومتریکی در ابعاد گستردتر در سطح کشور انجام شود تا بانک اطلاعاتی بزرگ‌تر و با میانگین واقعی‌تری از ابعاد بدن ایرانیان فراهم شود. این بانک اطلاعاتی باید در اختیار طراحان صنعتی قرار داده شود و آنان ملزم شوند در طراحی کلیه محصولات با کاربرد انسانی از آن استفاده کنند. بدون شک با توجه به شرایط خاصی که در انجام طرح حاضر برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر گرفته شده بود، از این داده‌ها نمی‌توان برای دامنه سنی پایین‌تر استفاده نمود، اما از آن جایی که در دامنه سنی انتخابی، تقریباً افراد از نظر رشد فیزیکی کامل هستند و تغییرات جسمی قابل توجهی نخواهند داشت، می‌توان برای دامنه‌های سنی بالاتر نیز از این داده‌ها استفاده کرد.

نکته قابل توجهی در تفاوت متغیرهای افراد ایرانی با انگلیسی و آمریکایی وجود دارد که با وجود تفاوت آماری بین متغیرهای این مطالعه با صدک‌های آمریکا و انگلیس،

گاه و ارتفاع تکیه گاه آرنج در حالت نشسته که در دو جنس اختلاف بسیار کمی (در حد چند صدم سانتیمتر) دارند [۱۲]. در مطالعه مشابه دیگری، ویژگی‌های آنتروپومتریک مردان ۲۰-۳۰ ساله بین ۲۴۱ نفر مالزیایی و ۶۴۶ نفر از عربستان سعودی با هم مقایسه شده‌اند که تفاوت معناداری در ابعاد بدن به جز ارتفاع چشم و آرنج در حالت ایستاده و ارتفاع قد، چشم، شانه و آرنج در حالت نشسته در دو جمعیت گزارش شده است. محققین این نتایج را برای طراحی ارگونومیک ایستگاه کار، تجهیزات حفاظت فردی، ابزار و سیستم‌های ارتباطی ضروری می‌دانند [۱۳]. در مطالعه دیگری، حافظی و همکاران بیان کرده‌اند که اطلاعات آنتروپومتریک می‌تواند با زمان تغییر کند و به همین دلیل جمع آوری این اطلاعات مهم است. در این مطالعه، ابعاد آنtronopometric ۱۰۱۵ دختر و ۱۰۱۵ پسر ایرانی ۷-۱۱ ساله نژاد فارس را بررسی و مقایسه نموده‌اند. در نهایت تفاوت‌هایی در بین بیش‌تر ابعاد اندازه‌گیری شده مشاهده شده است [۱۴].

نتایج این دو تحقیق نیز با مطالعه حاضر از این نظر که بین دو نژاد تفاوت معنادار وجود دارد و نمی‌توان از اندازه‌های یک نژاد برای نژاد دیگر استفاده نمود، همخوانی دارد. همچنین ترتیبیان و همکارش در بررسی ویژگی‌های آنتروپومتریکی دانشآموزان دختر ۱۱-۱۷ ساله ارومیه و مقایسه با استاندارد NCHS پس از اندازه گیری چند شاخص آنtronopometric در ۱۵۲۲ دانشآموز شامل ۶۳۴ نفر در مقطع راهنمایی و ۸۸ نفر در مقطع دبیرستان و مقایسه با استاندارد NCHS مشاهده کردن که قد، وزن، شاخص جرمی بدن این افراد به طور معناداری کمتر از استاندارد NCHS بوده است [۱۵].

در تحقیقاتی که در ادامه می‌آیند طراحی مجدد برخی تجهیزات بر اساس اندازه‌های آنتروپومتریک استفاده کنندگان انجام شده است. معمدزاده و همکارانش در یک مطالعه پس از آنtronopometric ۳۰۳ زن و مرد کارمند اقدام به طراحی و ساخت صندلی ارگونومیک منطبق با ابعاد بدنی کارمندان ایرانی کردند. سپس صندلی ساخته شده را مورد ارزیابی قرار داده و تفاوت معناداری بین دو صندلی مشاهده نمودند [۱۶]. مرتضوی و همکارانش در مطالعه‌ای تحت عنوان آنtronopometric اندام پا به روش عکس‌برداری دیجیتالی و اهمیت کاربرد آن در طراحی پوتین، اندازه ابعاد مهم پای نمونه‌ای از جامعه مردان ایرانی را برای استفاده آتی در طراحی و سایزبندی پوتین بدست آوردند. همچنین انجام مطالعات مشابه با لحاظ عواملی نظیر نژاد، سبک زندگی و نوع شغل برای طراحی ارگونومیک و اهداف پزشکی در بین

غیر ایرانی استفاده نمود.

تقدیر و تشکر: این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره ۸۳۰۶۶ مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشد، بدین‌وسیله از آن معاونت محترم و همچنین دانشجویانی که با شرکت و همکاری در طرح ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند تشکر می‌شود.

این اختلاف‌ها اکثراً در حد یک تا چند سانتیمتر است و در مورد برخی از پارامترها که در آن‌ها وسعت فضای لازم برای جاگیری افراد مطرح است برای کاهش هزینه طراحی و ساخت مجدد می‌توان از این موارد تبعیت کرد. اما در مورد پارامترهایی که امکان اغماض وجود ندارد مانند حدود دسترسی نمی‌توان از طراحی بر اساس استانداردهای

References:

- Mouodi MA. Anthropometry engineering. Sari: Mazandaran Univ Press; 1997: 45-88. (Persian)
- Choobineh AR. Human, anthropometry, ergonomics and design. Tehran: Ketabe Mad; 1997: 15-63. (Persian)
- Choobineh AR. Human agent engineering in industry. Shiraz: Chehr Publ; 2001: 20-25. (Persian)
- Choobineh AR. Human, anthropometry, ergonomics and design. Tehran: Ketabe Mad; 1997: 35-70. (Persian)
- Abdoli Eramaki M. Body mechanics and workstation design principles (ergonomics). Tehran: Omide Majd Publ; 2000: 241-50. (Persian)
- McCabe PT, Hanson MA, Robertson SA (eds). Contemporary Ergonomics 2000. Ney York: CRC Press; 2000: 1350-60.
- Sadeghi M, Tajik L, Karimi S, et al. Study of educational furniture conformity with students' anthropometric dimensions of Isfahan University of Medical Sciences. Yafteh, Quart Res J Lorestan Univ Med Sci 2009; 11(4): 75-80. (Persian)
- Habibi E, Hoseini M, Asaadi Z. The survey of student anthropometric dimensions Coordination with Settee and desks dimentions. Iran Occup Health 2009. 6(2): 51-61. (Persian)
- Varmazyar S, Ghalenoei M Amani Z, et al. Settee and desk design based on highschool female students' anthropometric dimensions in Ghazvin, 2007-8. J Ghom Univ Med Sci 2008; 2(3): 39-45. (Persian)
- Eesanejad A, Daneshmandi H, Norosteh AA. Settee heith effect on the students muscular fatigue of backbone streightener muscle and multi fidius while sitting. Proceedings of the First International Conferences on Ergonomics. Tehran: Olympic Hotel; 2007, November 20-21. (Persian)
- Woodson W, Tillman P, Tillman B. Human factor design handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Professional; 1992: 80-120.
- Joneidi A, Sadeghi F. Static anthropometric dimentions of 20-60 years old workers from six Iranian races. Health Manag 2007;11(32): 11-24. (Persian)
- Taha Z, Jomoa IM, Zadry HR. A study of anthropometric characteristics between Malaysian and Saudi Arabian males aged 20 to 30 years. J Hum Ergol 2009; 38(1): 27-32.
- Hafezi R, Mirmohammadi SJ, Mehrparvar AH, et al. An Analysis of anthropometric data on Iranian primary school children. Iran J Publ Health 2010; 39(4): 78-86. (Persian)
- Tartibian B, Akbari H. The survey and comparison of the anthropometric characteristics of 11-14 years old female students of URMIA with NCHS standard. Res Sport Sci 2008; 6(18): 171-83. (Persian)
- Motamedzade M, Hasanbeigi M, Choobineh AR, et al. Design and development of an ergonomic chair for Iranian office workers. Sci J Zanjan Univ Med Sci 2009; 17(68): 45-52. (Persian)
- Mortazavi SB, Joze Kanani M, Khavanin A, et al. Foot anthropometry by digital photography and the importance of its application in boot design. Military Med 2008; 10(1): 69-80.
- Laios L, Giannatsis J. Ergonomic evaluation and redesign of children bicycles based on anthropometric data. Appl Ergon 2010; 41(3): 428-35.

Comparison of Iranian student's anthropometric information and American and English standards

Habibi E¹, Sadeghi N^{2*}, Mansouri F³, Sadeghi M⁴, Ranjbar M¹

Received: 03/09/2010

Revised: 11/21/2011

Accepted: 12/07/2011

1. Dept. of Occupational Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2. Dept. of Occupational Health Engineering, School of Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
3. Deputy of Health, Shahid Sadooghi Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran
4. Dept. of Occupational Health Engineering, School of Health, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

Journal of Jahrom University of Medical Sciences, Vol. 10, No. 2, Summer 2012

J Jahrom Univ Med Sci 2012; 10(2):25-35

Abstract

Introduction:

Some musculoskeletal disorders, fatigue and human errors are rooted in the unsuitable design of the tools. Appropriate design is based on anthropometric data adapted to the target population. In our country, due to lack of anthropometric databases, data from western countries are used. The aim of this project is to compare physical dimensions of the Iranian people with non-Iranian and also ultimately prepare a database based on our body dimensions so that Iranian experts use this internal standard to design and manufacture our tools and equipment.

Materials and Methods:

This is a cross-sectional observational study in which 384 female and 384 male students from Isfahan University of Medical Sciences were randomly selected. 30 anthropometric variables were measured by anthropometer, calipers and balance. These data were analyzed by SPSS software, version 11.5 and the index percentile was calculated. The percentiles obtained in America and Britain were compared with our standards and the percentage of difference between them was determined.

Results:

The statistical anthropometric percentile was found as a database for both genders. This study compared British and American standards, showing the most significant difference between anthropometric variables of Iranian and non-Iranian people.

Conclusion:

The results of this study reveal that Iranian body dimensions are different from those of non-Iranian persons. Therefore, we can't use the standards of other countries to design tools and devices for Iranian people. The prepared database can be used as an anthropometric information bank based on national standards.

Keywords: Anthropometry, Body Size, Students, Database

* Corresponding author, Email: na.sadeghi@gmail.com

