

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجوش روی وزن و پروفایل لیپیدی در موش صحرایی نر ویستار

نویسنده‌گان:

میثم فروزنده^۱، محمد رضا بیگدلی^۲، مهدی رهنا^{۱*}

۱- مرکز تحقیقات بیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

۲- گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Pars Journal of Medical Sciences, Vol. 14, No.2, Summer 2016

چکیده:

مقدمه: امروزه در بیشتر کشورهای جهان افزایش چربی خون و به دنبال آن آترواسکلروز منجر به بیماری‌های قلبی-عروقی و حتی مرگ می‌شود. آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند سبب کاهش چربی خون شده و احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی را کاهش دهند. با توجه به این که مرزنجوش سرشار از آنتی‌اکسیدان است، در این مطالعه تأثیر آن روی وزن و چربی خون بررسی می‌شود.

روش کار: در این مطالعه تجربی، ۲۸ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به ۴ گروه ۷ تایی تقسیم شدند. گروه شاهد، آب مقطر و سه گروه آزمایشی عصاره هیدروالکلی مرزنجوش را به ترتیب با دوزهای ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳۰ روز از طریق گاواز دریافت کردند. دو ساعت بعد از آخرین گاواز، حیوانات وزن شده و خون گیری از آنها انجام و میزان کلسترول، تری‌گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی کم و لیپوپروتئین با چگالی بالا اندازه‌گیری شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS با آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که مصرف عصاره هیدروالکلی مرزنجوش سبب کاهش میزان کلسترول، تری‌گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالی کم و افزایش لیپوپروتئین با چگالی بالا در هر سه دوز مصرفی (۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) نسبت به گروه شاهد می‌شود ($p < 0.05$). مصرف عصاره تغییری در وزن حیوانات ایجاد نکرد.

بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که مرزنجوش بتواند به دلیل کاهش میزان کلسترول، تری‌گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی کم و افزایش میزان لیپوپروتئین با چگالی بالا اثر حفاظتی در برابر بیماری‌های قلبی-عروقی اعمال کند.

Pars J Med Sci 2016;14 (2):51-56

واژگان کلیدی: مرزنجوش، کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی بالا، لیپوپروتئین با چگالی پائین

مقدمه:

از اسیدهای چربی که خود سنتز کرده است و نیز اسیدهای چربی که از خون گرفته است، تری‌گلیسرید تولید کرده و آن را در دسته‌ای از لیپوپروتئین‌ها با چگالی خیلی کم (VLDL) جای می‌دهد. لیپوپروتئین با چگالی کم مهم‌ترین حامل کلسترول در خون است و سبب انتقال کلسترول از کبد به بافت‌های محیطی می‌شود. لیپوپروتئین با چگالی کم پس از خروج از کبد به بافت‌های محیطی رفته و به طریق اندوسیستور وارد سلول‌ها شده و محتویات خود را به سلول‌ها تحویل می‌دهد. کلسترول‌هایی که توسط لیپوپروتئین با چگالی کم به بافت‌ها منتقل می‌شود جزء ذخیره کلی

امروزه در اغلب کشورهای جهان افزایش چربی خون و به دنبال آن آترواسکلروز منجر به بیماری‌های قلبی-عروقی و حتی مرگ می‌شود. برای اولین بار در سال ۱۹۸۴ رابطه بین مقدار بالای کلسترول و بیماری‌های قلبی-عروقی مشخص شد. افزایش لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) اثرات حاد و مزمن روی عروق می‌گذارد [۱]. بیماری آترواسکلروز به عنوان یکی از بیماری‌های شایع در قرن حاضر منجر به ایسکمیک و در نهایت بروز انفارکتوس قلبی و سکته مغزی می‌شود. زنان به دلیل داشتن استروژن کمتر به این بیماری مبتلا می‌شوند [۲]. کبد با استفاده

* نویسنده مسئول، نشانی: زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، مرکز تحقیقات بیولوژی، گروه فیزیولوژی.

تلفن تماس: +۸۹۱۲۱۴۱۳۶۹ - نامبر ۹۸۴۴۳۳۴۵۵۸۹۰ پست الکترونیک: meh_rahnama@yahoo.com

پذیرش: ۹۵/۴/۱۹

اصلاح: ۹۵/۳/۱

دریافت: ۹۴/۳/۲۳

وابسته به دوز آنزیم استیل کولین استراز را مهار می‌کنند [۱۴]. اورسالیک اسید در مهار عوامل همولیتیک خون نیز اثر دارد و دارای اثرات ضدسرطانی و ضدالتهابی است [۱۵]. تجویز خوراکی تیمول در موش‌های صحرایی غلظت سوپر اکسید دسموتاز و گلوتاتیون پراکسیدیاز را کاهش می‌دهد [۱۶]. با توجه به طیف وسیع فعالیت آنتی‌اکسیدانی مرزنجوش، به نظر می‌رسد این گیاه بتواند سبب کاهش رادیکال‌های آزادشده و اکسیداسیون لیپیدی را کاهش دهد. به همین دلیل، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی مرزنجوش روی وزن بدن، میزان لیپوپروتئین‌های سرمی و میزان کلسترول و تری‌گلیسیرید خون انجام شد.

روش کار:

این مطالعه تجربی در زمستان سال ۱۳۹۳ در مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان انجام گرفت. موضوع مطالعه در جلسه کمیته اخلاقی دانشگاه آزاد زنجان مطرح و طی شماره IAU_Z_301 iauz.REC.1393.83 تصویب رسید. ۲۸ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار هشت تا ده‌ماهه در محدوده وزنی ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم از موسسه انسیتو پاستور کرج خریداری و در حیوان خانه مرکز تحقیقات بیولوژی در قفس‌های مناسب و در محدوده دمایی 2 ± 22 درجه سانتی‌گراد و ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی نگهداری شدند. حیوانات به صورت نامحدود به آب و غذا دسترسی داشتند. هنگام نگهداری و مطالعه تمام اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی رعایت شد. سپس حیوانات به صورت تصادفی به ۴ گروه که هر کدام شامل ۷ سر موش صحرایی نر بودند تقسیم شدند. گروه شاهد رژیم غذایی معمولی و آب مقطر را از طریق گاواز دریافت کردند. گروه‌های آزمایشی رژیم غذایی معمولی را به همراه عصاره هیدروالکلی مرزنجوش با دوزهای ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم به مدت ۳۰ روز به صورت خوراکی و از طریق گاواز دریافت کردند. گاواز حیوانات هر روز ساعت ۱۰-۱۱ صبح انجام می‌گرفت. دوزها بر اساس مطالعات قبلی انتخاب شدند [۱۷].

عصاره‌گیری:

گیاه مرزنجوش از مراث شهربستان خاکبنده از توابع استان زنجان جمع‌آوری و توسط گروه گیاه‌شناسی و هرباریوم دانشگاه آزاد زنجان از نظر تاکسونومیکی تأیید شد. گیاهان جمع‌آوری شده در سایه‌خشک و سپس پودر شدند. عصاره‌گیری به روش خیساندن انجام گرفت [۱۸]. برای این کار ۱۰۰ گرم از پودر در یک اrlen با الكل ۷۰ درصد مخلوط شد، به طوری که حلال تا ۲ ساعتی متر بالای پودر را بپوشاند. درب اrlen با ورق آلومینیومی پوشانده و برای ۲۴ ساعت نگهداری شد. در طول ۲۴ ساعت هر دو ساعت

سلول محاسب می‌شوند. لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) در انتقال رویه مرکز کلسترول نقش دارد و کلسترول اضافی را از بافت‌ها دور می‌کند [۳]. حضور مقادیر بالای لیپوپروتئین با چگالی کم و مقادیر کم لیپوپروتئین با چگالی بالا سبب تسريع بیماری آتروواسکلروز می‌شود [۴].

رادیکال‌های آزاد گونه‌های واکنش‌پذیری هستند که در واکنش‌های متابولیسمی بدن به طور طبیعی تولید می‌شوند و توسط سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی بدن حذف می‌شوند [۵]. عدم تعادل بین تولید رادیکال‌های آزاد و سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی سبب ایجاد استرس اکسیداتیو می‌شود [۶]. رادیکال‌های آزاد سبب اکسیداسیون ماکرومولکول هایی از قبیل لیپیدها و پروتئین‌ها شده و به دیواره عروق آسیب می‌زنند و احتمال بروز بیماری‌های عروقی را افزایش می‌دهند. آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند با حذف رادیکال‌های آزاد در کاهش ابتلاء به آتروواسکلروز مؤثر باشند [۵]. عواملی مانند عدم رضایت بیماران از مصرف داروهای کاهنده چربی خون، بروز عوارض جانبی ناشی از افزایش چربی خون طولانی‌مدت این داروها، بیماری‌های ناشی از افزایش چربی خون و هزینه‌های تحمیلی به بیماران موجب شده است که تمایل به درمان‌های جایگزین و سنتی افزایش یابد [۷]. گیاه مرزنجوش با نام علمی *Lamiaceae* از تیره (Labiatae) *Origanum vulgare* از

پراکنش وسیع جهانی دارد. این گیاه در مناطق شمال و شمال‌غرب ایران پراکنده‌گی بیشتر دارد و در مناطق گرم جنوبی یافت نمی‌شود [۸]. مرزنجوش در فارسی به نام‌های ورزنجوش و حشی و اویشن کوهی نیز ذکر شده است [۹]. در طب سنتی این گیاه به عنوان ضدسرفه، ضد التهاب، ضد درد، مقوی و معرق و تسکین‌دهنده سیستم عصبی مطرح شده است. همچنین برای درمان بیماری‌های چون قاعده‌گی دردناک، روماتیسم مفصلی، بیماری‌های کلیوی و اختلال هضم مورداستفاده قرار می‌گیرد [۹]. اثرات ضد دیابتی [۱۰]، ضد اضطرابی [۱۱] و آنتی‌اکسیدانی [۱۲] مرزنجوش نیز به اثبات رسیده است. از مهم‌ترین ترکیبات یافته شده در عصاره این گیاه می‌توان به مونوترين‌های فنلی‌تیمول (۳۵ درصد) و کارواکرول (۳۲ درصد) اشاره کرد. مشخص شده است که مونوترين‌های فنولی تیمول به راحتی می‌توانند از سد خون- مغزی عبور کرده و به صورت وابسته به دوز اثرات آنتی‌اکسیدانی اعمال کنند [۱۲]. از ترکیبات مهم دیگر موجود در این گیاه می‌توان به رزمارینیک اسید، اریوسیتین، آپی ژنین گلیکوزید و اوریگانول اشاره کرد که اثرات آنتی‌اکسیدانی قابل توجهی دارند [۹]. وجود سایر ترکیبات فلاونوئیدها علاوه بر رزمارینیک اسید و اورسالیک اسید، این گیاه را به عنوان یک آنتی‌اکسیدان بسیار مؤثر مطرح کرده است [۱۳]. تیمول، کارواکرول، p-سیمین و بورنثول به صورت

معناداری افزایش داد. با توجه به این که اختلاف معناداری بین گروههای دریافت‌کننده دوز ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره با گروههای دریافت‌کننده دوز ۵۰ و ۷۵ مشاهده شد، این کاهش وابسته به دوز است، اما تفاوت معناداری در وزن رت‌ها قبل و بعد از تیمار با عصاره نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد.

نتایج حاصل نشان داد که پیش تغذیه با عصاره هیدروالکلی مرزنجوش به مدت ۳۰ روز سبب کاهش معنادار میزان کلسترول سرمه در دوزهای ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه شاهد شد ($p<0.001$) (جدول ۱). همچنین بعد از گذشت ۳۰ روز میزان تری‌گلیسیرید سرمه نیز در هر سه دوز ۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم ($p=0.027$)، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم ($p<0.001$) نسبت به گروه شاهد به طور معناداری کاهش داشت (جدول ۱). میزان سرمه لیپوپروتئین با چگالی کم در هر سه گروه دریافت‌کننده عصاره با دوزهای ۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم ($p=0.016$)، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم ($p<0.001$) نسبت به گروه شاهد شد (جدول ۱).

وزن حیوانات قبل از تیمار در گروههای دریافت‌کننده عصاره هیدروالکلی مرزنجوش با دوزهای ۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، ۷۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم نسبت به وزن قبل از تیمار حیوانات گروه شاهد تفاوت معناداری نداشت. همچنین وزن حیوانات بعد از تیمار با عصاره در دوزهای ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم تفاوت معناداری با وزن آن‌ها بعد از تیمار گروه شاهد نداشت. وزن قبل و بعد از تیمار با عصاره هیدروالکلی مرزنجوش در دوزهای ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم و همچنین وزن قبل و بعد از تیمار در گروه شاهد نیز تفاوت معناداری نداشت (جدول ۲).

یکبار با یک همزن شیشه‌ای محتویات ارلن مخلوط شد. سپس مخلوط در دستگاه روتاری با دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد تا حلal جدا شود. پس از تغییط، عصاره در آون با دمای ۵۰ درجه قرار گرفت تا پودر عصاره به دست آید. سپس در زمان گاواز دوزهای ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم از عصاره تهییه شد.

سنچش لیپیدها و لیپوپروتئین‌های سرمه:

در روز سی‌ام، ۲ ساعت پس از گاواز آخر، حیوانات بعد از توزین، با داروی کلرال هیدرات به میزان ۴۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن بی‌هوش شدند و خون‌گیری انجام گرفت. سرم‌ها پس از سانتریفیوژ با سرعت ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه ($\text{g}=17888$)، به مدت ۱۰ دقیقه، استحصال و در دمای ۲۰ درجه سلسیوس منجمد شدند. سپس به وسیله دستگاه اتوآنالایزر (MINDRIW-BS800) میزان لیپوپروتئین با چگالی کم، لیپوپروتئین با چگالی بالا، تری‌گلیسیرید و کلسترول خون اندازه‌گیری شد [۱۹].

اندازه‌گیری وزن حیوانات:

پس از هر بار گاواز با عصاره هیدروالکلی مرزنجوش، حیوانات با ترازوی دیجیتال وزن شدند تا تأثیر عصاره بر وزن آن‌ها مشخص شود.

تحلیل‌های آماری:

تمام تحلیل‌های آماری به کمک نرم‌افزار SPSS V.18.0 انجام شد. میزان کلسترول، تری‌گلیسیرید، لیپوپروتئین با چگالی کم، لیپوپروتئین با چگالی بالا و وزن رت‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی بررسی شدند. $p<0.05$ از لحاظ آماری معنادار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها:

پیش تغذیه با عصاره هیدروالکلی مرزنجوش میزان سرمه تری‌گلیسیرید، کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی کم را به طور معناداری کاهش و میزان سرمه لیپوپروتئین با چگالی بالا را به طور

جدول ۱: مقایسه میزان کلسترول، تری‌گلیسیرید، لیپوپروتئین با چگالی کم و لیپوپروتئین با چگالی بالا

گروه	شاهد	دوز ۵۰ mg/kg	دوز ۷۵ mg/kg	دوز ۱۰۰ mg/kg
کلسترول*	۹۴/۸۶±۱/۵۶	۸۳/۱۴±۲/۰۳	۵۱/۰۰±۱/۶۹	۴۳/۸۶±۱/۴۵
تری‌گلیسیرید*	۷۶/۰۰±۱/۳۱	۷۰/۷۱±۱/۳۰	۶۰/۰۰±۱/۰۴	۴۲/۰۰±۱/۳۳
لیپوپروتئین با چگالی کم*	۵۸/۷۱±۱/۱۵	۵۲/۱۴±۱/۵۹	۳۸/۵۷±۱/۴۳	۲۹/۱۴±۱/۴۷
لیپوپروتئین با چگالی بالا*	۱۹/۴۳±۱/۰۶	۲۵/۸۶±۱/۲۸	۳۶/۵۷±۱/۷۰	۴۶/۱۴±۱/۱۰

* اختلاف معنادار نسبت به گروه کنترل ($p<0.05$)

جدول ۲: مقایسه وزن رت‌ها. وزن رتها قبیل و بعد از تیمار با عصاره (عدم تفاوت معنادار با گروه شاهد)

گروه	شاهد	۵۰ mg/kg	۷۵ mg/kg	۱۰۰ mg/kg
قبل تیمار	۲۷۱/۷۷±۴،۰۱	۲۷۲،۰۸±۳،۸۵	۲۷۳،۳۴±۳،۹۸	۲۷۴،۰۲±۳،۸۰
بعد تیمار	۲۸۱/۷۱±۲،۸۰	۲۸۲،۷۴±۳،۵۶	۲۸۴،۷۹±۳،۸۱	۲۸۴،۶۹±۳،۸۹

سازوکار عمل ترکیبات آنتیاکسیدانی در کاهش لیپیدها و لیپوپروتئین‌های سرم، از طریق مهار بیوسنتر کلسترول است. تنظیم میزان کلسترول در ابتدای مسیر آن یعنی در مرحله HMG-CoA (هیدروکسی‌متیل گلوتاتیون کوآنزیم A) اعمال می‌شود. واکنش تبدیل هیدروکسی‌متیل گلوتاتیون کوآنزیم A به موالونات تحت تأثیر هیدروکسی‌متیل گلوتاتیون کوآنزیم A ردوکتاز و نیکوتین‌آمید دی‌نوکلوتیود فسفات هیدروژن (NADPH)، مرحله تنظیمی اصلی در بیوسنتر کلسترول و همچنین محل اثر داروهای کاهنده کلسترول است [۲۶]. گیاه مرزنجوش به دلیل وجود ترکیبات فنولی موجود در آن از جمله رزمارینیک اسید، کافئیک اسید و پروتوکاتچوئیک اسید و گلیکوزیدهای مربوطه دارای خاصیت آنتیاکسیدانی قوی است [۲۷]. همچنین در ترکیب این گیاه میزان فنول‌تام و فلاونوئیدها بالاست، فلاونوئیدها دارای خاصیت خند میکروبی، خذالت‌هایی و ضد تب هستند و همچنین خاصیت آنتیاکسیدانی نیز دارند. مصرف فلاونوئیدها سبب کاهش ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی می‌شود [۲۷]. ترکیبات فنولی با وزن مولکولی بالا مانند تانن، توئانی‌ای زیادی برای پاکسازی رادیکال‌های آزاد داشته و فعالیت آنتیاکسیدانی معادل ترولکس دارند و این موضوع به تعداد حلقه‌های آروماتیک و ماهیت گروه‌های جایه‌جاشونده هیدروکسیل بستگی دارد. با توجه به این که گیاه مرزنجوش دارای ترکیبات فنولی با وزن مولکولی بالا بوده در نتیجه فعالیت آنتیاکسیدانی منحصر به‌فردی دارد [۲۷].

نتیجه‌گیری:

به نظر می‌رسد مرزنجوش از طریق کاهش میزان کلسترول، تری‌گلیسیرید و لیپوپروتئین با چگالی کم و افزایش میزان لیپوپروتئین با چگالی بالا بتواند اثرات حفاظتی در برابر بیماری‌های قلبی-عروقی اعمال کند. با توجه به خاصیت آنتیاکسیدانی اثبات شده مرزنجوش شاید عصاره آن نیز به دلیل مشابه سبب کاهش میزان کلسترول، تری‌گلیسیرید و لیپوپروتئین با چگالی کم و افزایش میزان لیپوپروتئین با چگالی بالا شود. برای تأیید این موضوع به مطالعات گستره‌تری نیاز است. از این رو پیشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی اثر درمانی مرزنجوش بر موش‌های صحرایی تعذیب شده با رژیم پرکلسترول مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین استخراج ترکیبات آنتیاکسیدانی این گیاه و

پیش تعذیب با عصاره هیدروالکلی مرزنجوش در دوزهای ۵۰، ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، میزان کلسترول، تری‌گلیسیرید و لیپوپروتئین با چگالی کم‌خون را کاهش داده و سبب افزایش میزان لیپوپروتئین با چگالی بالا سرمی شد، اما تأثیری بر وزن رت‌ها نداشت.

همان‌گونه که کرفس کوهی به دلیل حضور فلاونوئیدهای موجود در ترکیش، با کاهش فعالیت آنزیم ۳-هیدروکسی-۳-متیل گلوتاتریل کوا و افزایش رسپتورهای کبدی اثر کاهنده‌گی لیپیدی خود را اعمال می‌کند [۲۰]، شاید سازوکار عمل مرزنجوش نیز به دلیل حضور این ترکیبات باشد [۱۳]. عسگری و همکاران نیز نشان دادند که مصرف خوراکی گیاه تاج‌خرروس سبب کاهش تری‌گلیسیرید، کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی کم شده و میزان لیپوپروتئین با چگالی بالا را افزایش می‌دهد. آن‌ها اثر هیپولیپیدمیک این گیاه را به خاصیت کاهنده‌گی پراکسیداسیون لیپیدی و جمع کنندگی رادیکال‌های آزاد اکسیژن نسبت دادند [۲۱] که در تأیید مطالعه حاضر است. براون و همکاران طی یک متابولیزیل با بررسی ۶۷ کارآزمایی بالینی نشان دادند که فیبرهای محلول به طور وابسته به دوز، میزان کلسترول‌تام و لیپوپروتئین با چگالی کم را کاهش می‌دهند [۲۲]. در مطالعه الرخ و همکاران نیز مشخص شد که عصاره زنجیبل سبب کاهش میزان کلسترول، تری‌گلیسیرید و لیپوپروتئین با چگالی کم شد. آن‌ها این اثر را به حضور پلی فنول‌ها و فلاونوئیدهای این گیاه که خاصیت آنتیاکسیدانی دارند، نسبت دادند [۲۳] که با نتایج مطالعه حاضر همسو است.

در مطالعه کاظمی و همکاران نیز مشخص شد که مرزنجوش در دوزهای بالا (۴۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) اثرات آندروغنیک داشته و سبب تقویت محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-گناد می‌شود. محققان این اثرات را به ترکیبات آنتیاکسیدانی این گیاه نسبت دادند [۲۴]. همچنین ثابت شده است که مرزنجوش به دلیل حضور فلاونوئیدها و آلکالوئیدها سبب کاهش اضطراب در موش‌های صحرایی شده و اثرات تسکینی بر بدن اعمال می‌کند [۱۱]. در یک بررسی ثابت شد که مرزنجوش از اکسیداسیون LDL جلوگیری می‌کند. این اثر به مقادیر بالای پلی فنول‌ها یعنی رزمارینیک اسید و فلاونوئیدها نسبت داده می‌شود [۲۵].

تعارض منافع:

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسنده‌گان بیان نشده است.

بررسی اثر این ترکیبات بر پروفایل لبییدی به صورت جدآگانه می‌تواند سازوکار دقیق اثر این گیاه بر چربی‌های خون را آشکار سازد.

تشکر و قدردانی:

بدین وسیله نویسنده‌گان از خانم الهام قاسملو به دلیل همکاری در انجام این مطالعه نهایت تشکر و قدردانی را دارند.

References:

1. Kishor S, Jain MK, Kathiravan RS. The biology and chemistry of hyperlipidemia. *Bioorg Med Chem* 2007; 15(14): 674-820.
2. Stone R.M. Disorders of the cardiovascular system. In: Braunwald E, Fauci A.S, Kasper D.L, Hauser S.L, Longo D.L and Jameson J.L. (ed.) *Harrison's Principles of internal Medicine*. Vol I. 15th ed., USA, Mc Graw Hill Co; 2001: 96-146.
3. Roughani M, Sohrabi Z, Sadeghi M. Antihyperglycemic and hypolipidemic effect of oral administration of capsicum frutescens in male streptozotocin-diabetic rats. *J Med Plants* 2004; 3(10):47-52. (Persian)
4. Bullon P. Obesity, diabetes mellitus, atherosclerosis and chronic periodontitis: a shared pathology via oxidative stress and mitochondrial dysfunction. *Periodontol* 2014; 64(1):139-153.
5. Jahanbakhsh Z, Mohammad MT, Jafari M, et al. Role of oxidative stress in the aortic constriction-induced ventricle hypertrophy in rat. *Physiol Pharmacol* 2012; 16(2): 146-155.
6. Letonja, M. Association of the C242T polymorphism in the NADPH oxidase p22 phox gene with carotid atherosclerosis in Slovenian patients with type 2 diabetes. *Mol Biol Rep* 2012; 39(12): 10121-10130.
7. Falah Hosseini H, Dastpak A, Fakhrzadeh H, et al. Review of antihyperlipidemic herbal medicine. *J Med Plants* 2005; 4(15):9-20. (Persian)
8. Mirzaei A, Jaber Hafashani H, Madani A. Antioxidant activities, total phenols and total Flavonoids assay of Origanum vulgare, Teucrium polium and Thymus daenensis, Hormozgan J Med Sci 2011;15(4): 285-294. (Persian)
9. Zargari A. Iranian Medicinal Plants.4st ed. Tehran: Tehran University Press; 1987: 51-9. (Persian)
10. Lemhadri A, Zeggwagh N-A, Maghrani M, et al. Anti-hyperglycemic activity of the aqueous extract of origanum vulgare growing wild in Tafilalet region. *J Ethnopharmacol* 2004; 92(2-3) : 251 - 6
11. Rezai A, Jafari B, Moosavi Gh, et al. Study of anxiolytic effect of herbal extract of *Origanum majorana L.* incomparison with diazepam in rat. *J Med Aromatic Plant* 2014; 30(1): 134-141.
12. Youdim KA, Deans SG. Effect of thyme oil and thymol dietary supplementation on the antioxidant status and fatty acid composition of the ageing rat brain. *Br J Nutr* 2000; 83(1): 87-93.
13. Meizoso I. R, Marin FR, Herrero M et al. Subcritical water extraction of nutraceuticals with antioxidant activity from oregano. *Chemical and functional characterization.* *J Pharm Biomed Anal* 2006; 41(5):1560-5.
14. Lynch M.A, Long term potentiation and Memory. *Physiol Rev* 2004; 84(1): 87-136.
15. Lee HK, Nam GW, Kim SH, et al. Phytochemicals of triterpenoids, oleanolic acid and ursolic acid, regulated differently the processing of epidermal keratinocytes via PPAR-alpha pathway. *Exp Dermatol* 2006; 15: 66-73.
16. Mecocci P, Mariani E, Cornacchiola V, et al. Antioxidants for the treatment of mild cognitive impairment. *Neurol Res* 2004; 26(5): 598-602.
17. Ramadan G, El-Beih NM, Arafa NM, et al. Preventive Effects of Egyptian Sweet Marjoram (*Origanum majorana L.*) Leaves on Haematological Changes and Cardiotoxicity in Isoproterenol-Treated Albino Rats. *Cardiovasc Toxicol* 2013; 13(2): 100-9.
18. Nichols M, Townsend N, Luengo-Fernandez R, et al. European Cardiovascular Disease Statistics. European Heart Network, Brussels, European Society of Cardiology, Sophia Antipolis; 2012:8-14.
19. Hauser EC, Kasperzyk JL, d'Azzo A, et al. Inheritance of lysosomal acid beta-galactosidase activity and gangliosides in crosses of DBA/2J and knockout mice. *Biochem Genet* 2004; 42(7-8): 241-57.
20. Davalos A, Fernandez-Hernando C, Cerrato F, et al. Red grape juice polyphenols alter cholesterol homeostasis and increase LDL-receptor activity in human cells in vitro. *J Nutr* 2006; 136(7): 1766-73.
21. Asgari S, Kabiri N, Madani H, et al. Antiatherosclerotic effect of Amaranthus caudatus and Hypericum perforatum in hypercholesterolemic rabbits. *J Shahrekord Univ Med Sci* 2008; 10(3):55-62. (Persian)
22. Brown L, Rosner B, Willett WW, et al. Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: a meta-analysis. *Am J Clin Nutr* 1999; 69(1):30-42.
23. ElRokh el-SM, Yassin NA, El-Shenawy SM, et al. Antihypercholesterolaemic effect of ginger rhizome (*Zingiber officinale*) in rats. *Inflammopharmacology* 2010; 18(6):309-15.
24. Kazemi P, Johary H, Sharifi E, et al. Androgenic Effect of *Origanum vulgare L.spp viride* extract on Hormone Level of Pituitary - gonadal Axis in Mature Male Vistar Rats. *J Arak Univ Med Sci* 2012;14(59):89-96.
25. Kulisic T, Krisko A, Dragovic-Uzelac V, et al. The effects of essential oils and aqueous tea infusions of oregano (*Origanum vulgare L. spp. hirtum*), thyme

- (*Thymus vulgaris* L.) and wild thyme (*Thymus serpyllum* L.) on the copper-induced oxidation of human low-density lipoproteins. *Int J Food Sci. Nutr* 2007; 58(2):87 -93.
26. Shahrani M,Pileh Varan A,Kheyri S, et al. The effect of *Amirkabiria odorastissima* on blood fatty in Rat. *J Shahrekord Univ Med Sci* 2008; 9:50-56. (Persian)
27. Lagouri V, Boskou D. Nutrient antioxidants in regano. *Int J Food Sci Nutr* 1996; 47(6):493-497.

The effect of hydro alcoholic extract of *Origanum vulgare* on weight and serum lipid profile in male Wistar rats

Meysam Foroozandeh¹, Mohammadreza Bigdeli², Mehdi Rahnema*¹

Received: 06/13/2015

Revised: 05/21/2016

Accepted: 07/9/2016

1. Biology Research Center, Zanjan-Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2. Dept of Physiology, School of Biological Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Pars Journal of Medical Sciences, Vol. 14, No.2, Summer 2016

Pars J Med Sci 2016;1s4(2):51-56

Abstract

Introduction:

Today, hyperlipidemia, followed by atherosclerosis, leads to cardiovascular diseases and even death in most countries. Antioxidants can reduce blood cholesterol and risks of cardiovascular diseases. Given that *Origanum vulgaris* is full of antioxidants, we aimed to study the effects of *Origanum vulgare* extract (OVE) on serum lipid profile and weight.

Methods and Materials:

In this study, 28 male Wistar rats were divided into four groups ($n=7$). The control group received distilled water, three experimental groups received the hydroalcoholic OVE at different doses of 50, 75 and 100 mg/kg, respectively. Pretreatment with OVE was performed for 30 days orally through gavage. Two hours after the last gavage, the rats were weighed, then blood samples were collected to measure serum levels of cholesterol, triglyceride, low density lipoprotein (LDL) and high density lipoprotein (HDL). The data were analyzed using one-way ANOVA in SPSS.

Results:

The results of the current study showed that OVE reduced the levels of cholesterol, triglycerides, low density lipoprotein and increased the level of high density lipoprotein in the three groups receiving OVE (50, 75 and 100 mg/kg) compared to the control group. OVE did not cause changes in rats' weight.

Conclusion:

It appears that OVE can exert a protective effect against cardiovascular diseases by reducing the levels of cholesterol, triglyceride, low density lipoprotein and increasing high density lipoprotein.

Keywords: *Origanum*, Cholesterol, Triglycerides, HDL, LDL

* Corresponding author, Email: meh_rahnema@yahoo.com