

تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی بر استرس، اضطراب، افسردگی و فشارخون بیماران پیوند کلیه

نویسنده‌گان:

محسن ثالثی^۱، الهام شکور^۱، سمیه پوران فر^۱، مریم کوشکی جهرمی^۱، جمشید روزبه^{۲*}

۱- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

۲- مرکز تحقیقات نفرو یوروولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

Pars Journal of Medical Sciences, Vol. 12, No. 3, Fall 2014

چکیده:

مقدمه: استفاده از روش‌های غیر دارویی مانند تمرین ورزشی برای کاهش اختلالات و مشکلات جسمانی و روانی که بعد از پیوند کلیه پیش می‌آید، حائز اهمیت است. هدف مطالعه حاضر، بررسی یک دوره فعالیت ورزشی منتخب به عنوان یک روش غیر دارویی مؤثر بر فشارخون، استرس، اضطراب و افسردگی بیماران پیوند کلیه بود.

روش کار: ۵۰ بیمار پیوند کلیه داوطلب (۲۱ مرد و ۲۹ زن)، به عنوان آزمودنی برای شرکت در تحقیق انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین (30 نفر) و کنترل (۲۰ نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تمرین به مدت ۵ هفته، سه روز در هفت‌هه و هر جلسه ۶۰-۹۰ دقیقه در یک برنامه فزاینده ورزشی شرکت کردند، ولی آزمودنی‌های گروه کنترل در این مدت در هیچ فعالیت ورزشی منظم شرکت نداشتند. اطلاعات روان‌شناسخی بیماران از طریق پرسش‌نامه DASS21 و فشارخون قبل و بعد از هفته تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون t با روش نمره افزوده استفاده شد.

یافته‌ها: فعالیت ورزشی موجب کاهش معنادار استرس، اضطراب، افسردگی ($p < 0.001$) و فشارخون سیستولیک ($p = 0.007$) آزمودنی‌های گروه تمرین نسبت به گروه کنترل شد.

بحث و نتیجه‌گیری: ده هفته فعالیت ورزشی منتخب باشدت پایین می‌تواند در بهبود استرس، اضطراب، افسردگی و کنترل فشارخون بیماران پیوند کلیه مؤثر باشد.

وازگان کلیدی: فعالیت ورزشی، استرس، اضطراب، افسردگی، فشارخون، پیوند کلیه

Par J Med Sci 2014;12(3):31-38

مقدمه:

وجود مشکلات مختلف از قبیل وابستگی به دستگاه دیالیز، اضطراب و هزینه‌های بالا، برای ادامه حیات خود اقدام به پیوند کلیه کنند [۱، ۵، ۷، ۸]. پیوند کلیه هم‌اکنون به عنوان یک روش مؤثر در درمان نارسایی مزمن و پیشرفت‌هه کلیه مطرح است [۲]. اما با وجود مزایای فراوان، پس از عمل پیوند همچنان بیماران با انبوهی از مشکلات جدید روبرو هستند [۳، ۵، ۶، ۷، ۸]. پیوند کلیه در کنار مزایایش، دارای عوارض متعدد و مختص به خود است که می‌تواند مشکلات روانی و اجتماعی فراوانی برای فرد بیمار به وجود آورد [۴]. شیوع اختلالات روانی قبل از پیوند

نارسایی مزمن کلیوی مرحله آخر اختلال کلیوی پیش‌رونده غیرقابل برگشت است که در آن توانایی بدن برای حفظ تعادل مایع و الکترولیت از بین می‌رود و منجر به اورمی یا ازتمی می‌شود [۵]. این بیماران بدون درمان جایگزینی کلیه قادر به ادامه حیات نخواهند بود [۶]. جمعیت افرادی که به بیماری کلیوی مرحله آخر مبتلا می‌شوند سالانه ۶ درصد افزایش می‌یابد. تعداد بیماران نارسایی مزمن کلیوی در ایران ۲۵ هزار نفر گزارش شده است [۷] که ۵۲/۷ درصد این بیماران از همودیالیز و ۴۵/۵ درصد از پیوند استفاده می‌کنند [۸]. بیماران اغلب ترجیح می‌دهند با توجه به

* نویسنده مسئول، نشانی: شیراز، فلکه نمازی، درمانگاه امام رضا، طبقه ۳ واحد ۱، مرکز تحقیقات پیوند کلیه

تلفن تماس: ۰۷۱۳-۲۳۱۹۴۰۴؛ پست الکترونیک: Rozbehj@sums.ac.ir

اصلاح: ۹۳/۳/۲۸؛ دریافت: ۹۳/۳/۵

با توجه به مطالب فوق، تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر ۵ هفته فعالیت ورزشی منتخب بر استرس، اضطراب، افسردگی و فشارخون بیماران پیوند کلیه طراحی و اجرا شد.

روش‌ها:

مطالعه حاضر پژوهشی نیمه تجربی، از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه‌های تمرین و کنترل بود. آزمودنی‌های تحقیق شامل ۵۰ نفر از بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان نمازی شیراز با دامنه سنی ۲۰ تا ۵۰ سال بودند که بر اساس نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرین (۳۰ نفر) و کنترل (۲۰ نفر) قرار داده شدند. شرایط ورود به مطالعه، گذشت زمان ۲ تا ۳ سال از عمل پیوند کلیه، عدم مصرف الکل و کافئین، عدم شرکت منظم در فعالیت‌های ورزشی در نظر گرفته شد. ۴۲ درصد از آزمودنی‌ها مرد و ۶۴ درصد متاهل بودند. بعد از انتخاب، آزمودنی‌ها در یک جلسه توجیهی ضمن تشریح نوع و برنامه تمرین‌ها و نتایج احتمالی پژوهش، با روش رکاب‌زنی روی دوچرخه کارستنج (شرکت نوتلیسیس کشور آمریکا)، کار با تردیمیل (شرکت نوتلیسیس کشور آمریکا) و دیگر تمرینات ورزشی مورد استفاده در پژوهش آشنا شدند. فشارخون آزمودنی‌ها در وضعیت نشسته قبل و بعد از ده هفته فعالیت ورزشی اندازه‌گیری و پرسشنامه DASS21 توسط آنان تکمیل شد. این پرسشنامه ابزار خودستجوی افسردگی، اضطراب و استرس با ۲۱ سؤال و سه خرده مقیاس مساوی (۷ سؤال) در خصوص هر یک از شاخص‌های مورد بررسی است [۳۱] که روابی و پایابی آن توسط صاحبی [۳۲]، عاقبتی، مرادی‌پناه و همکاران تأیید شده است [۳۳].

آزمودنی‌های گروه تمرین به مدت ده هفته، هر هفته سه جلسه ۶۰-۹۰ دقیقه‌ای در یک برنامه ورزشی شرکت کردند. برنامه ورزشی از نظر نوع، شدت، تناوب و تکرار حرکات ورزشی با توجه به شرایط جسمانی بیماران توسط پژوهشگر و با نظارت متخصص فیزیولوژی ورزش و نیز پژوهش مختصه پس از دو مرحله مطالعه مقدماتی و تأیید اینمی، کارابی و سهولت انجام آن، طراحی شده بود. هر جلسه تمرین شامل سه مرحله گرم کردن، اصلی و سرد کردن بود. مرحله گرم کردن شامل ۱۵-۱۰ دقیقه انجام حرکات کششی و نرمش قسمت‌های مختلف بدن، مرحله اصلی شامل ۳۵-۶۵ دقیقه تمرین به صورت دایره‌ای در ۹-۱۷ ایستگاه با ترکیبی از تمرینات هوایی (روی دوچرخه ثابت یا تردیم با شدت ۴۰-۷۰ درصد حداقل ضربان قلب) و تمرینات مقاومتی (۴۵-۶۵ دقیقه در ۱۰ سال تحت درمان با هموالیز نیز تأثیر مثبت داشته است [۳۱].

۱۱/۱ درصد و دو ماه پس از پیوند ۳۶/۱ درصد گزارش شده است. احساس افسردگی و اضطراب در بیماران کلیوی بسیار شایع است (۱۰). در مطالعه دابلز و همکاران که در خصوص بررسی میزان افسردگی گیرندگان کلیه روى ۴۷۸۹۹ نفر بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ انجام شد، ۳۳۶۰ نفر بعد از سه سال چار افسردگی شده بودند [۱۱]. در تحقیق انجام شده در تهران نیز میزان افسردگی در بیماران پیوند کلیه مشابه با بیماران دیالیزی گزارش شده است [۱۰].

یکی دیگر از مشکلات جسمانی بیماران پیوند کلیه پر فشارخونی است که از عوارض شایع بعد از پیوند می‌باشد [۱۲]. شیوع افزایش فشارخون پس از پیوند کلیه در شرایط مصرف سیکلوسبورین ۶۰ درصد تا ۸۰ درصد است [۱۳]. در مطالعه‌ای شیوع افزایش فشارخون پس از پیوند کلیه ۹۰ درصد [۱۴] و در مطالعه کوانسنس و همکاران ۸۲ درصد گزارش شده است [۱۵]. افزایش فشارخون باعث آترواسکلروزیس تسریع یافته پس از پیوند کلیه شده و عامل خطرزای مهمی برای مرگ و میر قلبی-عروقی و نارسایی کلیه پیوندی است [۱۶، ۱۳، ۱۷، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۲۱].

تحقیقات اخیر نشان داده است که شیوه زندگی می‌تواند در ایجاد استرس، اضطراب و فشارهای روانی و به دنبال آن افزایش فشارخون تأثیرگذار باشد [۲۲]. علائم روان‌شناختی نظیر افسردگی، اضطراب از جمله همراهان شایع فشارخون بالا هستند که سبب تشدید و طولانی شدن بیماری و تأخیر در بهبود آن می‌شود [۲۳]. نتایج تحقیق بوثرس و همکاران نشان داد که افراد دارای فشارخون بالا، بیشتر چار افسردگی می‌شوند [۲۴]. همچنین واسیوک و همکاران نشان دادند که افسردگی و اضطراب در بیش از ۵۰ درصد از بیماران با فشارخون بالا دیده می‌شود [۲۵]. این یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که احتمالاً این دو بیماری در فرد، به صورت یک سیکل معیوب عمل کرده، هر کدام به طور پیوسته موجب تشدید دیگری شده که خود باعث ناتوانی بیشتر فرد مبتلا خواهد شد [۲۶].

از طرف دیگر، شواهد زیادی وجود دارد که فعالیت بدنی، اثرات مفید متعددی بر سلامتی بیماران کلیوی دارد [۲۷ و ۲۸] و می‌تواند با کاهش علائم اضطراب و افسردگی، باعث ارتقا احساس خوب بودن و بهبودی خلق شود [۲۹]. الواسکی و همکاران نشان دادند که فعالیت بدنی و ورزش باعث جلوگیری از اختلالات روانی همچون افسردگی و اضطراب در سالمدان می‌شود [۳۰]. همچنین برنامه‌های ورزشی منظم بر میزان افسردگی کودکان ۸ تا ۱۲ سال تحت درمان با هموالیز نیز تأثیر مثبت داشته است [۳۱].

پس آزمون) برای مقایسه متغیرها در دو گروه تمرین و کنترل استفاده شد.

یافته‌ها:

وزن، قد، سابقه بیماری، سن و فشارخون دو گروه آزمودنی‌ها در جدول ۱ و ویژگی‌های مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق در جدول ۲ آورده شده است.

۱- ۲ دقیقه و استراحت بین دایره‌ها ۳-۵ دقیقه بود. افراد گروه کنترل در طول تحقیق در هیچ فعالیت ورزشی منظم شرکت نداشتند. متغیرهای تحقیق در انتهای دوره فعالیت ورزشی به روش مشابه باز دیگر اندازه‌گیری شدند.

داده‌های حاصل با کمک نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. با توجه به انتخاب داوطلبانه آزمودنی‌ها وجود تفاوت اولیه بین دو گروه از روش نمره افزوده (اختلاف نمرات پیش‌آزمون و

جدول ۱: ویژگی‌های توصیفی مربوط به نمرات دو گروه کنترل و تمرین

زمان آزمون	گروه‌ها			
	پیش‌آزمون	پس آزمون	کنترل	تمرین
	پیش‌آزمون	پس آزمون	کنترل	تمرین
وزن (کیلوگرم)	میانگین	۶۲/۰۳	۶۴/۰۵	۶۲/۷۷
(سانتی‌متر)	انحراف استاندارد	۱۴/۴۲	۱۴/۴۶	۱۰/۳۸
قد	میانگین	۱۶۲/۹۷	۱۶۶/۷۳	۱۶۶/۷۳
(سانتی‌متر)	انحراف استاندارد	۲/۲۱	۱/۷۸	۱/۷۸
سابقه بیماری (سال)	میانگین	۱۳/۰۶	۷/۸	۷/۸
(سال)	انحراف استاندارد	۱/۹۳	۱/۳۲	۱/۳۲
سن	میانگین	۳۶/۳۷	۳۶/۱۳	۳۶/۱۳
(سال)	انحراف استاندارد	۱/۹۰	۲/۴۱	۲/۴۱
فشارخون سیستولیک (میلی‌متر جیوه)	میانگین	۱۱۶	۱۱۸	۱۳۳
(میلی‌متر جیوه)	انحراف استاندارد	۱/۷۱	۲/۶۱	۱/۳۵
بیشینه	کمینه	۹۰	۹۰	۱۲۵
بیشینه	میانگین	۱۴۰	۱۶۰	۱۴۰
فشارخون دیاستولیک (میلی‌متر جیوه)	میانگین	۷۶	۷۶	۸۶/۳
(میلی‌متر جیوه)	انحراف استاندارد	۱/۰۸	۱/۸۳	۱/۹۱
بیشینه	کمینه	۶۰	۶۰	۷۰
بیشینه	میانگین	۸۰	۱۰۰	۹۵
استرس	میانگین	۴/۷۷	۱۱/۹۷	۱۰/۵۵
	انحراف استاندارد	۲/۵۶	۳/۸۴	۴/۰۰
	کمینه	۱	۴	۲
	بیشینه	۱۰	۱۹	۱۶
اضطراب	میانگین	۲/۱۰	۷/۴۳	۶/۳۵
	انحراف استاندارد	۲/۰۹	۳/۵۵	۴/۷۳
	کمینه	۰	۱	۲
	بیشینه	۱۰	۱۵	۱۹
افسردگی	میانگین	۳/۰۰	۸/۸۳	۷/۷۰
	انحراف استاندارد	۲/۲۲	۳/۹۸	۴/۳۶
	کمینه	۰	۲	۰
	بیشینه	۹	۱۷	۱۶

جدول ۲: مقایسه تغییرات فشارخون سیستولیک، دیاستولیک بیماران پیوند کلیه پس از ده هفته فعالیت ورزشی منتخب در دو گروه کنترل و تمرین

تفاوت میانگین تغییرات متغیر	میانگین تغییرات	انحراف	آماره t	سطح	معناداری
بین دو گروه تمرین و کنترل	تغییرات	معیار	تغییرات	معناداری	

۰/۰۰۷	۲/۸۴	۹/۲۵ ۷/۸۸	۱/۱۶ -۶/۰	تمرین کنترل	فشارخون سیستولیک
۰/۲۰	۱/۲۹	۶/۰۶ ۴/۰۰	۰/۵۰ -۱/۵۰	تمرین کنترل	فشارخون دیاستولیک
۰/۰۰۱	۷/۹۶	۳/۹۹ ۱/۴۸	۷/۲۰ -۰/۲۵	تمرین کنترل	استرس
۰/۰۰۱	۷/۶۳	۲/۹۹ ۰/۷۱	۵/۳۳ ۰/۱۰	تمرین کنترل	اضطراب
۰/۰۰۱	۷/۹۴	۳/۰۸ ۱/۳۳	۵/۸۳ ۰/۰۱	تمرین کنترل	افسردگی

سازوکار دقیق چگونگی تأثیر تمرین روی کاهش فشارخون ناشناخته است. کاهش فشارخون می‌تواند به دلیل کاهش کاتکولامین‌های تولید شده بر اثر تمرین باشد. این واکنش در کاهش مقاومت محیطی در برابر جریان خون و متعاقب آن کم شدن فشارخون سهیم است. همچنین فعالیت‌های ورزشی می‌تواند دفع سدیم از کلیه‌ها را تسهیل کرده و در نتیجه سبب کاهش حجم مایع و فشارخون شود [۴۰]. به نظر می‌رسد فعالیت‌های ورزشی می‌توانند با افزایش تعداد مویرگ‌ها در عضلات اسکلتی فعال، افزایش بروونده، کاهش مقاومت عروق به علت اتساع پذیری، کاهش مقاومت در برابر جریان خون، بهبود تنظیم عصبی عروق خونی، کاهش مقاومت محیطی، کاهش ضربان قلب در زمان استراحت و فعالیت باعث کاهش فشارخون شود [۴۱]. این سازگاری‌ها، سطح عرضی حفره را افزایش داده و موجب بهبودی در اتساع عروق شده به طوری که با افزایش جریان خون در هنگام ورزش کردن می‌توان فرایند حذف مواد زائد را ایجاد کرد که خود در بهبود و کنترل فشارخون مؤثر است [۳۴]. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیماران پیوند کلیه گروه تمرین که برنامه ورزشی طراحی شده را طی مدت ده هفته انجام دادند کمتر از گروه کنترل بود.

نتایج این تحقیق با یافته‌های مک‌ماهان [۴۲]، ساکستا و همکاران [۴۳]، فاکس [۴۴]، کالفاس و تیلوو [۴۵]، پالسچی و همکاران [۴۶]، اصفهانی و همکاران [۴۷]، دیمو و همکاران [۴۸]، کالدن و همکاران [۴۹] همسو بود. از سویی مکالی در بررسی خود نشان داد که اگرچه ورزش نقش مثبتی در سلامت روانی دارد، ولی در بعد اضطراب، استرس و افسردگی اثرگذار نیست [۵۰]. همچنین حال بیان کرده است که فعالیت بدنی توسط روان شناسان بالینی و روان‌پزشکان به عنوان راهبرد مداخله‌ای کارآمد مورد پذیرش قرار نگرفته است [۵۱].

به نظر می‌رسد تفاوت‌های موجود بین نتایج این پژوهش با دیگر مطالعات به طور عمده با عواملی از جمله استفاده از پروتکلهای

مقایسه میانگین دو گروه کنترل و گروه تمرین در پیش‌آزمون و پس‌آزمون فشارخون سیستولیک ($t=2/84$ و $p=0/007$)، استرس ($t=7/96$ و $p=0/001$) و اضطراب ($t=7/63$ و $p=0/001$) با آزمون t مستقل کاهش معنادار مشاهده شد.

بحث:

نتایج این تحقیق نشان داد که یک دوره فعالیت ورزشی می‌تواند باعث کاهش فشارخون سیستولیک، استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران پیوند کلیه نسبت به گروه کنترل شود. یکی از اهداف پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرینات ورزشی بر فشارخون بیماران پیوند کلیه می‌باشد. به دلیل این که معمولاً این افراد دچار اضافه وزن و فشارخون بالا می‌باشند، بنابراین تمرینات ورزشی در راستای کاهش فشارخون می‌تواند مفید و مؤثر باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انجام ده هفته فعالیت ورزشی منتخب اثر معناداری بر کاهش فشارخون سیستول دارد. تحقیقی یافت نشد که دقیقاً مشابه تحقیق حاضر تأثیر فعالیت ورزشی را بر فشارخون بیماران پیوند کلیه بررسی کرده باشد، اما در خصوص تحقیقاتی که روی آزمودنی‌های دیگر انجام شده است، نتایج این پژوهش با مطالعه کریستن و جوهانسن [۳۴] که در تحقیق خود کاهش و کنترل فشارخون را بعد از یک ورزش هوایی در بیماران کلیوی مزمن گزارش داده‌اند، نتیجه گزارش اسملتزر و همکاران [۳۵] که بیانگر کاهش فشارخون سیستولیک در بیماران مبتلا به فشارخون با فعالیت فیزیکی و با نتایج یانگ و همکاران [۳۶] و اینس و همکاران [۳۷] هم‌راستا، ولی با نتایج مایلر و همکاران [۳۸] که مشاهده کردند پس از شش ماه فعالیت بدنی توسط بیماران همودیالیزی، هیچ تغییر معناداری در میزان فشارخون وجود نداشت و با نتایج هوردون و همکاران [۳۹] هم‌راستا نبود. تفاوت بین این پژوهش‌ها و پژوهش حاضر را می‌توان به تفاوت بین شدت و مدت برنامه‌های تمرینی، سن، جنسیت، سطح آمادگی و وضعیت سلامت آزمودنی‌ها نسبت داد.

وجود دارد که از ارتباط بین افسردگی و پرفشاری خون حمایت می‌کنند [۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰]، اما تعدادی از مطالعات گزارش‌های متناقضی ارائه کرده‌اند [۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴]. در یک مطالعه، با بررسی ۵۰۸ بیمار طی چهار سال هیچ‌گونه ارتباطی بین افسردگی و پرفشاری خون دیده نشد [۶۵] و در یک بررسی با پیگیری ۲۰ ساله مشخص شد، بیمارانی که دارای علائم افسردگی بوده‌اند، در طول زمان بیش‌تر از افراد غیر افسرده به پرفشاری خون مبتلا شده‌اند [۶۶]. این یافته‌های متناقض حاکی از آن است که رابطه افسردگی و پرفشاری خون می‌تواند یک رابطه دو سویه چندعاملی باشد که برخی از آن‌ها نقش مستعد کننده و برخی نقش حمایتی را بازی می‌کنند. شناخت دقیق این عوامل باهدف برنامه‌ریزی‌های مداخله‌ای همچنان مطالعات بیش‌تر و با متداول‌تری‌های قوی‌تری را می‌طلبد [۲۷].

نتیجه‌گیری:

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و سایر پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام‌شده است، به نظر می‌رسد که فعالیت‌های منظم بدنه می‌تواند علاوه بر رژیم غذایی و داروهای مصرفی از عوامل مداخله‌گر مهم و مؤثر در بهبود روند فشارخون، استرس، اضطراب و افسردگی بیماران پیوند کلیه باشد. بنابراین ورزش می‌تواند به عنوان راهی برای پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های بهداشتی درمانی در نظر گرفته شود. البته در پژوهش حاضر عدم کنترل رژیم غذایی آزمودنی‌ها، میزان فعالیت بدنه خارج از جلسات تمرین و میزان استرس و اضطراب ایجاد شده در طول تحقیق از محدودیت‌هایی بودند که پیشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی مورد توجه واقع شوند.

مختلف با متغیرها و شدت‌های تمرينی متفاوت، شرایط متفاوت جسمانی و تمرينی افراد، وضعیت تعذیبه‌ای، وضعیت روحی- روانی آزمودنی‌ها، جنسیت و سن بیماران در ارتباط باشد.

مشخص شده است ورزش باعث کاهش فشارهای عصبی و افسردگی در محیط کار می‌شود. در توجیه این پدیده می‌توان گفت افزایش سطح سروتونین و نورابی نفرین در هنگام فعالیت‌های ورزشی موجب کاهش افسردگی می‌شود [۵۲]. به عبارت دیگر، تمرينات بدنه از دو راه بر روح و روان انسان اثر می‌گذارد: یکی از طریق رها شدن آندرفین و دیگری کاهش سطوح کورتیزول (هورمونی که با فشار عصبی در خون ترشح می‌شود). بر طبق نظر متخصصان فیزیولوژی، آندرفین‌ها داروهای طبیعی کاهش درد و بروز احساسات خوشایند هستند که افزایش میزان ترشح آن‌ها از طریق تمرينات بدنه است [۵۳]. برخی محققان معتقدند که تمرينات بدنه در افزایش میزان ترشح سروتونین (هورمون مؤثر در اصلاح خلق و خو) تأثیر به سزاپی دارند [۵۴]. بنابراین، به نظر می‌رسد ورزش از یکسو کمک می‌کند که آندرفین و سروتونین بیش‌تری به بدنه برسد و از سوی دیگر برای مدت طولانی‌تری در فرایند تمرين حفظ شود [۵۵].

صرف بیش‌تر داروهای ضد فشارخون و بروز عوارض جانبی این داروها و ناتوان تر شدن فرد در اثر عوارض تدریجی فشارخون را می‌توان از عوامل احتمالی بروز بیش‌تر افسردگی با گذشت زمان دانست [۲۷]. رایکین و همکاران نشان دادند که فراوانی نسبی افسردگی در بیماران مبتلا به فشارخون تحت درمان، سه برابر افراد غیر مبتلا به فشارخون است و بیماران مبتلا به افسردگی از نظر مصرف داروی فشارخون همکاری کمتری دارند [۵۶]. عراقچیان و همکاران فراوانی ابتلا به افسردگی را در این گروه از بیماران ۴۸/۶ درصد گزارش کرده‌اند [۵۷]. مطالعات دیگری نیز

References:

- Nasabeh Z, Hazrati M. Medical surgical nursing. Tehran: Salami-Jamenegar Publ; 2008.
- Ghods A, Savaj S. Iranian model of paid regulated livingunrelated kidney donation. Clin Asoc Nephrol 2006;1:1136-45.
- Grassman AN. ESRD patients in 2004: Global overview of patient numbers, treatment modalities and associated trends. Nephrol Dial Transplant 2002;17(1):2587-93.
- Haghani AN, Broumand BD, Amico M, et al. The epidemiology of end stage renal disease in Iran in an international prospective. Nephrol Dial Transplant.2002;17(1):28-32.
- Shu-Fen N, Chu A. Quality of life of patient having renal replacement therapy. J Adv Nurs 2005;51(1):15-21.
- Mohajer M. The survey of psychosocial change in-patient before and after renal transplantation in
- Taleghami and Shahid Hashemi Nejad hospitals. Res Med 2002;28(2):3135-40.
- Poorghaznein T, Ghafari F. The survey of relation between hopeless and self-steal in kidney transplant recipients in Emam Reza hospital in Mashhad (2001-2002). Yazd Univ Med Sci J. 2005;13(1):57-61.
- Fisher R, Gould D, Wainwright S, et al. Quality of life after renal transplantation. J Clin Nurs 1998;7:553-63.
- Harrison's principles of internal medicine, Disorder of the kidney & urinary tract, Translated & supervised by Tarbiat M, Tarbiat A, Tehran: Nooredanesh publ; 2006:147.
- Masoudi Alavi N, Sharifi Kh, Aliakbarzadeh Z. Depression and anxiety in patient undertaken renal replacement therapy in Kashan during 2008. Fayz J 2009;4(12):46-51. [Persian]
- Fabienne D, Melissa A, Skeans J, et al. Depressive disorder in renal transplantation: An analysis of

- medicate claims. Am J Kidney Dis 2008;51(5):819-28.
12. Kasiske BL, Vozquez MA, Harmon WI. Recommendations for the out patients surveillance of renal transplantation. J Am Soc Nephrol 2000; 11: 1-86.
 13. Magee CC, Milford E, Clinical aspects of renal transplantation. In: Brenner BM, Rector FC. The kidney. 7 th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2004.
 14. Budde K, Waisser J, Fristche L. Hypertension in patients after renal transplantation. Transplant Proc 1997; 29:201-9.
 15. Koamans HA, Joles J, Robelink TJ. Hypertension and the kidney. Nephrol Dial Transplant 1996; 11: 1961-4.
 16. Opelz G, Wujciak T, Ritz E. Association of chronic kidney graft failure with recipient blood pressure. Kidney Int 1998; 53(1): 217-22.
 17. Warbolm C, Wikzek H, Pettersson E. Hypertension two years after renal transplantation. Transplant Int 1995;8(2): 288-9.
 18. Cosio FG, Falkenhain ME, Pesavento TE. Relationships between arterial hypertension and renal allograft survival in African-American patients. Am J Kidney Dis 1997; 29(3): 419-22.
 19. Hernandez D. Left ventricular hypertrophy after renal transplantation. Nephrol Dial Transplant 2004; 19(7):1682-7.
 20. Menge CK, Feldman HZ, Joffe MM. Blood pressure and the survival of renal allografts from living donor. J Am Soc Nephrol 2004; 15(1): 187-19.
 21. Fernandez-Fresnedo G, Escallada R, D Francisco M. Association between pulse pressure and cardiovascular disease in renal transplant patients. Am J Transplant 2005; 5(2): 394-7.
 22. Hamidizadeh S, Ahmadi F, Asghari M. Study effect of relaxation technique on anxiety and stress in elders with hypertension. J Shahrekhord univ Med Sciences 2006; 8 (2): 45-51. [Persian].
 23. Roohafza HR, Saeedi M, Sadeghi M, et al. An open heart can impact on psychological stress in an Iranian population. J Res Med Sci 2006; 8(3): 94-7. [Persian].
 24. Bosworth HB, Bartash RM, Olsen MK, et al. The association of psychosocial factors and depression with hypertension among older adults. Int J Geriatr Psychiatry 2003; 18(12): 1142-8.
 25. Vasiuk I, Nesterova EA, Dovzhenko TV, et al. Modern antidepressants in complex management of patients with hypertension and concomitant affective disorders. Kardiologija 2004;44(8): 72-9.
 26. Kheirabadi Gh, Bagherian-Sararoudi R, Masaeli N, et al. Comparison of depression rates between subjects with and without Hypertension. J Res Behav scince 2012; 9:1735-2029.
 27. Lippi G, Schena F, Salvagno GL, et al. Acute variation of estimated glomerular filtration rate following a half-marathon run. Int J Sports Med 2008; 29(12): 948-51.
 28. Smeltzer SCOC, Bare BG, Brunner LS. Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing. 10th ed. edTrans. Philadelphia: Lippincott; 2004. [Persian]
 29. Asci FH. The Effects of physical fitness training on trait anxiety and physical self-concept of female university student. J Psychol Sport Exercise 2003; 4(2): 255-64.
 30. Elavsky S, McAuley E, Motl RW, et al. Physical activity enhances long-term quality of life in older adults: efficacy, esteem, and affective influences. Ann Behav Med 2005; 30(2): 138-45.
 31. Salehi J, Soleil Ziae S. A comparative study of anxiety, stress and depression in physically abused and non-abused Iranian wives. IJPBS 2009;3(2):15-25.
 32. Sahebi A, Asghari MJ, Salari R. Validation of depression, anxiety and stress (DASS-21) for Iranian population. Iran Psychol 2005;1(4):50-60. [Persian]
 33. Rahimi A, Ahamadi F, Gholif M. Effects of applying Continuous Care Model (CCM) on stress, anxiety and depression in hemodialysis patients. J Shahid Beheshti Univ Med Sci 2007;4(30):353-9. [Persian]
 34. Johansen KL. Exercise and chronic kidney disease: current recommendations. Sports Med 2005; 35(6): 485-99.
 35. Maher, Kathy. "Brunner and Suddarth's Text-book of Medical-Surgical Nursing Gastroenterol Nurs 1993;15(4): 182
 36. Yang K, Bernardo LM, Sereika SM, et al. Utilization of 3-month Yoga program for Adults at High Risk for Type 2 Diabets. Evid Based Complement Alternat Med 2011;6(21)-6
 37. Innes KE,Vincent HK. The influence if yoga-based programs on risk profiles in adults with type 2 diabetes mellitus: a sysstsmatic review. Evid Based Complement Alternat Med 2007 Dec;4(4):469-86.
 38. Miller BW, Cress CL, Johnson ME, et al. Exercise during hemodialysis decreases the use of antihypertensive medications. Am J Kidney Dis 2002; 39(4): 828-33.
 39. Hordern MD, Cooney LM, Beller EM, et al. Determinants of changes in blood glucose response to short-term exercise training in patient with type2 diabetes. Clin Sci (Lond) 2008;115(9):273-81.
 40. Chen HH, Chen YL, Huang CY, et al. Effects of one-year swimming training on blood pressure and insulin sensitivity in mild hypertensive young patients. Chin J Physiol 2010;53(3):185-9.
 41. Andreazzi AE, Scomparin DX, Mesquita FP, et al. Swimming exercise at weaning improves glycemic control and inhibits the onset of monosodium Lglutamate-obesity in mice. J Endocrinol 2009; 201(3):351-9.
 42. MacMahon JR. The psychological benefits of exercise and the treatment of delinquent adolescents. Sports Med 1990; 9(6): 344-51.
 43. Saxena S, Ommeren MV, CTang K, et al. Mental health benefits of physical activity. J Meantal Health 2005; 14(5): 445-51.
 44. Fox KR. The influence of physical activity on mental well-being. Public Health Nutr 1999; 2(3A): 411-8.
 45. Calfas KJ, Taylor WC. Effects of physical activity on psychological variables in adolescents. Pedlatr Exerc Sci 1994; 6: 406-23.
 46. Palleschi L, De Gennaro E, Sottosanti G, et al. The role of exercise training in aged subjects with anxietydepression syndrome. Arch gerontology geriatrics 1998; 26(1): 381-84.
 47. Esfahani N. Effect of exercise on mental health in somatization, anxiety, sleep disorders, social dysfunction and depression in Azahra University students. Motion Magazine 2002; 12: 75-87.

48. Dimeo FC, Stieglitz RD, Novelli-Fischer U, et al. Effects of physical activity on the fatigue and psychologic status of cancer patients during chemotherapy. *Cancer* 1999; 85(10): 2273-7.
49. Kolden GG, Strauman TJ, Ward A, et al. A pilot study of group exercise training (GET) for women with primary breast cancer: feasibility and health benefits. *Psychooncology* 2002; 11(5): 447-56.
50. McAuley G. Physical activity, fitness and anxiety. *Human Kinetic* 1994; 57(5): 551-68.
51. Hale AS. ABC of mental health. Depression. *BMJ* 1997; 315(7099): 43-6.
52. Smith LL, Elliott CH. Demystifying and defeating depression. *Depression for dummies*. New Jersey, NJ: Wiley 2003: 9-20.
53. Western ,Deborah. Depression in Women. In *Gender-based Violence and Depression in Women*. Springer New York, 2013: 33-44.
54. Dunn AL, Trivedi MH, Kampert JB, et al. Exercise treatment for depression efficacy and dose response. *American J of Prev Med* 2005; 28(1): 1-8.
55. Asci FH. The Effects of physical fitness training on trait anxiety and physical self-concept of female university student. *J Psychol Sport Exerc* 2003; 4(2): 255-64.
56. Rabkin JG, Charles E, Kass F. Hypertension and DSM-III depression in psychiatric outpatients. *Am J Psychiatry* 1983; 140(8): 1072-4.
57. Araghchian M, Seyf Rabiei MA, Zeraati F, et al. The survey of depression frequency in hypertensive patients. *Sci J Hamedan Univ Med Sci Health Serv* 2010; 16(4): 37-41. [Erasian].
58. Jonas BS, Franks P, Ingram DD. Are symptoms of anxiety and depression risk factors for hypertension? Longitudinal evidence from the National Health and Nutrition Examination Survey I Epidemiologic Follow-up Study. *Arch Fam Med* 1997; 6(1): 43-9.
59. Goldberg EL, Comstock GW, Graves CG. Psychosocial factors and blood pressure. *Psychological Medicine* 1980; 10(2): 243-55.
60. Macdonald LA, Sackett DL, Haynes RB, et al. Labelling in hypertension: A review of the behavioural and psychological consequences. *J Chronic Dis* 1984; 37(12): 933-42.
61. Dimsdale JE. Research links between psychiatry and cardiology. Hypertension, type A behavior, sudden death, and the physiology of emotional arousal. *Gen Hosp Psychiatry* 1988; 10(5): 328-38.
62. Heine BE, Sainsbury P, Chynoweth RC. Hypertension and emotional disturbance. *J Psychiatr Res* 1969; 7(2): 119-30.
63. Wheatley D, Balter M, Levine J, et al. Psychiatric aspects of hypertension. *Br J Psychiatry* 1975; 127(4): 327-36.
64. Davies SJ, Ghahramani P, Jackson PR, et al. Panic disorder, anxiety and depression in resistant hypertension--a case-control study. *J Hypertens* 1997; 15(10): 1077-82.
65. Shinn EH, Poston WS, Kimball KT, et al. Blood pressure and symptoms of depression and anxiety: a prospective study. *Am J Hypertens* 2001; 14(7 Pt 1): 660-4.
66. Jonas BS, Lando JF. Negative affect as a prospective risk factor for hypertension. *Psychosom Med* 2000; 62(2): 188-96.

Original Article

The Effect of a selected exercise on, stress, anxiety and depression in kidney transplant patients

Received: 6/29/2014

Revised: 8/20/2014

Accepted: 10/11/2014

1.Dept. of Physical Education and Sport Sciences, School of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

2. Nephro_urology Researcher Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Pars Journal of Medical Sciences, Vol. 12, No. 3, Full 2014

Abstract

Introduction:

Using non-medical methods such as exercise can be effective for reducing the number of physical and mental disorders that occur after kidney transplantation. The present study aimed to investigate the effectiveness of a period of regular physical activity of choice as a non-medical method for reducing blood pressure, stress, anxiety and depression in patients with kidney tra

Par J Med Sci 2014;12(3):31-38

Materials & Methods:

Fifty kidney transplant patients (21 males and 29 females) volunteered as the study subjects and were randomly divided into two groups -an exercise group (n=30) and a control group (n=20). The exercise group partook in a progressive exercise program for ten weeks with three sessions of 60-90 minutes each week while the control group did not partake in any regular physical activityPsychological data of participants as well as their blood pressure before and after the 10-week period were collected using the DASS21 questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and the t-test with the gain score method.

Results:

Exercise significantly reduced stress, anxiety and depression ($P<0.001$) as well as systolic blood pressure ($P=0.007$) in the exercise group compared to the control group.

Conclusion:

Partaking in ten weeks of a light-intensity exercise of choice can improve stress , anxiety and depression and control blood pressure in patients with kidney transplants.

Keywords: exercise, Stress, Anxiety, Depression, Kidney Transplant

* Corresponding author, Email: Roozbehj@sums.ac.ir