

مقایسه اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران

نویسنده‌گان:

مرجان مردانی حموله^۱، عزیز شهرکی واحد^۲، مهین روزی طلب^۳

۱- بخش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۲- بخش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

۳- بخش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی چهرم، دوره هشتم، شماره چهار، زمستان ۸۹

چکیده:

مقدمه: آموزش بیماران، سودمندی‌های زیادی از جمله افزایش رضایت مندی، بهبود کیفیت زندگی، کاهش عوارض بیماری‌ها، کاهش هزینه‌های درمانی و کاهش میزان مراجعه مجدد بیماران را به دنبال دارد. این مطالعه با هدف مقایسه اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، پرستاران بیمارستان فاطمه زهرا (س) نجف‌آباد اصفهان (۹۰ نفر) و ۱۲۰ نفر بیمار که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. داده‌های جمع‌آوری شده به کمک نرم افزار SPSS به روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون من ویتنی یو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد بین دیدگاه پرستاران و بیماران درباره اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار تفاوت معنی‌دار وجود دارد ($P<0.05$) و نمره پرستاران در مقایسه با نمره بیماران در خصوص اهمیت (۴۸/۲۸) در برابر (۴۶/۲۸) و اجرای آموزش به بیمار (۳۸/۶۴) در برابر (۲۷/۹۱) بیشتر بوده است. از دیدگاه پرستاران آموزش به بیمار توسط پرستاران دارای انگیزه بالا بیشترین اهمیت را داشته و آموزش به بیمار مطابق نیازهای آموزشی وی بیشتر اجرا می‌شده است. در حالی که از دیدگاه بیماران آموزش به بیمار توسط پرستاران با اطلاعات علمی بالا بیشترین اهمیت را داشته و برقراری ارتباط صحیح در هنگام آموزش به بیمار بیشتر اجرا می‌شده است.

بحث و نتیجه گیری: میانگین نمره پرستاران نسبت به بیماران در خصوص اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار بالاتر بود. یافته‌های این پژوهش می‌تواند راهنمای پرستاران برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران از طریق آموزش به آن‌ها باشد.

واژگان کلیدی: آموزش، پرستار، بیمار

مقدمه:

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می‌رود. از طرفی منشور حقوق بیمار نیز بیان می‌دارد، این حق بیمار است که از افراد مراقب در مورد تشخیص، نوع درمان و پیش‌آگهی بیماری اطلاعات دقیقی دریافت کند [۱]. عوامل متعددی ضرورت آموزش به بیمار را دو چندان می‌نماید که از جمله مهم ترین آن‌ها می‌توان به پیشگیری از بیماری‌ها، بهبودی و کاهش درد وی، سازگاری با بیماری‌های مزمن و ناتوانی‌ها، کوتاه شدن

فرایند قادرسازی افراد برای افزایش کنترل خود بر سلامتی و بالا بردن سطح آن گویای مفهوم ارتقا سلامت می‌باشد. بر اساس این رویکرد، بیمارستان‌ها به عنوان یکی از مراکز مهم ارتقادهنه سلامتی، افزایش کیفیت برنامه‌های آموزشی و آموزش مهارت‌های خودمراقبتی برای بیماران و خانواده‌های آنان را مد نظر قرار داده اند. در همین راستا، آموزش به بیمار یکی از ابعاد مهم مراقبت‌های پرستاری و از نقش‌های کلیدی پرستاران در

سطح اطمینان ۹۵ درصد و توان آزمون ۹۰ درصد تعیین شد. معیارهای ورود به مطالعه برای پرستاران، دارا بودن حداقل یک سال سابقه کار و تمایل به شرکت در مطالعه بود. معیار ورود در مورد بیماران بستری بودن حداقل دو روزبستری در بیمارستان، هوشیار بودن و داشتن توانایی ذهنی جهت پاسخگویی به سوالات بود. در این مطالعه پرستاران و بیماران بخش‌های اورژانس، اطفال، آی‌سی یو و اتاق عمل که به دلیل شرایط ویژه شان، امکان آموزش به بیمار کم تر فراهم بود و همچنین بیمارانی که به دلایل گوناگون مانند کهولت سن و سطح هوشیاری پایین قادر به برقراری ارتباط مناسب نبودند، مورد بررسی قرار نگرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. پرسشنامه مربوط به پرستاران در قسمت مشخصات فردی شامل جنس، سن، وضعیت تا هل، تحصیلات، نوع استخدام، سابقه کار و بخش محل کار بود و در قسمت دوم به بررسی اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه آنان می‌پرداخت. سوالات قسمت دوم پرسشنامه با مروری بر متون علمی مرتبط با آموزش به بیمار طراحی شده بود که شامل ۲۰ عبارت جهت سنجش اهمیت خدمات آموزش به بیمار و ۲۰ عبارت مشابه برای سنجش اجرای آن در طیف لیکرت ۴ درجه‌ای بود. این ابزار اهمیت خدمات آموزش به بیمار را به صورت بی‌اهمیت، کم اهمیت، اهمیت متوسط و اهمیت زیاد با نمرات ۰، ۱، ۲ و ۳ و اجرای آن را به صورت اجرا نمی‌شود، اجرای کم، اجرای متوسط و اجرای زیاد با نمرات ۰، ۱، ۲ و ۳ مورد بررسی قرار می‌داد. دامنه نمره ۶۰-۰ و نحوه نمره گذاری کلی آن به این صورت بود که نمرات ۱۵-۰، ۳۰-۰، ۴۵-۳۱ و ۶۰-۴۶ برای سنجش اهمیت خدمات آموزش به بیمار به ترتیب معادل اهمیت ندارد، کم اهمیت، اهمیت متوسط و اهمیت زیاد در نظر گرفته شد و در مورد اجرای خدمات آموزش به بیمار نیز نمرات ذکر شده به ترتیب معادل اجرا نمی‌شود، اجرای کم، اجرای متوسط و اجرای زیاد لحاظ گردید. پرسشنامه مربوط به بیماران در قسمت مشخصات فردی شامل جنس، سن، وضعیت تا هل، تحصیلات و بخش محل بستری بود. قسمت دوم پرسشنامه بیماران در ارتباط با اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار، مشابه ابزار به کارگرفته شده برای پرستاران طراحی شده بود. اعتبار علمی ابزار به روش اعتبار محتوا بررسی شد. به این منظور پرسشنامه در اختیار تنی چند از اساتید محترم رشته پرستاری قرار گرفت و اعتبار محتوای آن تایید شد. به منظور تعیین پایایی ابزار نیز از روش بازآزمایی بهره گرفته شد. برای این کار تعداد پرسشنامه به فاصله ۱۰ روز طی دو نوبت به ۱۰ نفر از هر دو گروه پرستاران و بیماران داده شد و در نهایت ضریب همبستگی پیرسون پاسخ‌های داده شده طی دو نوبت برای پرستاران و بیماران محاسبه شد، برای پرستاران $r=0.82$ و برای بیماران $r=0.85$ به دست

مدت بستری، کاهش عود بیماری، بهبود کیفیت زندگی، اطمینان از تداوم مراقبت‌ها، کاهش اضطراب بیمار، کاهش بروز عوارض بیماری‌ها، افزایش شرکت در برنامه‌های مراقبتی و افزایش استقلال بیمار در انجام فعالیت‌های روزانه اشاره نمود [۲]. بررسی‌ها نشان می‌دهند بیمارانی که اطلاعات لازم را در قالب خدمات آموزش به بیمار دریافت نموده اند به طور معنی داری از مراقبت‌های ارائه شده خشنودتر بوده اند [۳]. از نگاهی دیگر، آموزش به بیمار، فواید اقتصادی نیز دارد به طوری که در آمریکا سالانه حدود ۶۹ تا ۱۰۰ میلیون دلار برای مشکلات درمانی ناشی از عدم ارائه آموزش به بیمار هزینه می‌شود [۱].

نکته مهم در این میان آن است که چون پرستاران وقت زیادی را با بیماران می‌گذرانند و ارتباط نزدیکتری با آنان دارند، بنابراین عمدۀ آموزش‌های لازم باید از سوی پرستاران به بیماران ارائه شود، چرا که آموزش به بیمار اولویت‌ها و استانداردهای مراقبتی محسوب می‌شود. این در حالی است که مطالعات انجام شده در ایران نشانگر آن است که آموزش مورد نیاز بیمار توسط پرستاران به قدر کافی ارائه نمی‌شود و دلایل آن را کمبود وقت کارکنان پرستاری، منابع ناکافی و محیط نامناسب، فقدان دانش و آگاهی پرستاران و اهمیت ندادن به این موضوع برشمرده اند [۴].

لذا با توجه به اهمیت مقوله آموزش به بیمار و با در نظر داشتن این نکته که اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه به صورت تک گروهی بوده اند و بیش تر به بررسی دیدگاه پرستاران پرداخته‌اند، مطالعه حاضر سعی نموده است دیدگاه بیماران را نیز مورد بررسی قرار دهد. زیرا بررسی دیدگاه بیماران و مقایسه آن با دیدگاه پرستاران می‌تواند اختلافات را آشکار سازد و از این طریق پرستاران را با شناخت دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان، قادر به ارائه خدمات جامع تر و با کیفیت بهتر در خصوص آموزش به بیمار نماید. به این منظور، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران انجام شد.

روش کار:

پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقطوعی بوده است. جامعه پژوهش شامل پرستاران شاغل در بیمارستان فاطمه زهراء (س) نجف آباد اصفهان و نیز بیماران بستری آن بیمارستان در سال ۱۳۸۸ بوده اند. در این تحقیق کلیه پرستاران دارای مدارک تحصیلی لیسانس پرستاری و دپلم بهیاری شاغل در بخش‌های داخلی (زنان و مردان)، جراحی (زنان و مردان)، سی‌سی یو و زنان و زایمان به روش سرشماری (۹۰ نفر) و بیماران بستری همین بخش‌ها (۱۲۰ نفر) به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم نمونه بیماران با در نظر گرفتن

داشته است و در مرتبه دوم اهمیت، اختصاص یک پرستار ویژه چهت امر آموزش به بیمار با میانگین نمره 0.44 ± 0.089 دارد. قرار داشته است. در مقابل کمترین اهمیت از دیدگاه بیماران مربوط به مورد آموزش به بیمار با در نظر داشتن فضای مناسب آن با میانگین نمره 0.081 ± 0.094 است. یافته ها در خصوص اجرای خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران بیانگر آن بود که بیش ترین اجرا در مرتبه اول مربوط به آموزش بر طبق نیازهای آموزشی بیمار با میانگین نمره 0.72 ± 0.087 و در مرتبه بعد آموزش به بیمار با در نظر داشتن وقت لازم با میانگین نمره 0.84 ± 0.085 بوده اند. در مقابل کم ترین اجرا از دیدگاه پرستاران مربوط به امکان ارائه خدمات آموزشی به خانواده بیمار با میانگین نمره 0.38 ± 0.165 بود. دیگر نتایج پژوهش نشان داد از نظر بیماران در مورد اجرای خدمات آموزش به بیمار، برقراری ارتباط صحیح در هنگام آموزش به بیمار با میانگین نمره 0.65 ± 0.091 در مرتبه اول و انجام آموزش به بیمار توسط پرستاران با مهارت عملی بالا با میانگین نمره 0.69 ± 0.089 در مرتبه دوم قرار داشته اند و در مقابل کمترین اجرا مربوط به استفاده از وسایل آموزشی مناسب با میانگین نمره 0.52 ± 0.054 بود. یافته های دیگر نشان داد در میان مشخصات فردی پرستاران بین متغیر سابقه کار با اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار اختلاف معنی دار آماری وجود دارد ($P < 0.05$) ولی در سایر موارد اختلافی دیده نشد. در گروه بیماران نیز بین مشخصات فردی آنان با اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار اختلاف معنی دار مشاهده نشد.

جدول ۱: توزیع فراوانی اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار در دو گروه پرستاران و بیماران

بیماران تعداد (درصد)	پرستاران تعداد (درصد)	اهمیت و اجرا
(۵) ۶	(۲/۳) ۲	اهمیت ندارد
(۱۸/۳) ۲۲	(۷/۴) ۳	اجرا نمی شود
(۸/۴) ۱۰	(۸/۹) ۸	کم اهمیت
(۴۰) ۴۸	(۷/۸) ۷	اجرای کم
(۲۸/۳) ۳۴	(۳۵/۵) ۳۲	اهمیت متوسط
(۱۵) ۱۸	(۵۰) ۴۵	اجرای متوسط
(۵۸/۳) ۷۰	(۵۳/۳) ۴۸	اهمیت زیاد
(۲۶/۷) ۳۲	(۳۸/۹) ۳۵	اجرای زیاد
(۱۰۰) ۱۲۰	(۱۰۰) ۹۰	جمع هر گروه

بحث و نتیجه گیری:

بر مبنای یافته های این مطالعه بین دیدگاه پرستاران و بیماران در زمینه اهمیت خدمات آموزش به بیمار اختلاف معنادار آماری وجود دارد و میانگین نمره پرستاران در این زمینه از میانگین نمره بیماران بیش تر می باشد. در حقیقت آموزش به بیمار یکی

آمد. تکمیل پرسشنامه توسط پرستاران مورد مطالعه و بیماران دارای سواد بالا به صورت خودآیفا و در بیماران کم سواد به صورت مصاحبه با پژوهشگر انجام شد. اهداف پژوهش برای نمونه ها شرح داده شد و همگی با رضایت آگاهانه در تحقیق شرکت کردند و به آن ها در خصوص تمایل به آگاهی از نتیجه SPSS ۱۳ و با به کارگیری آمار توصیفی (میانگین و انحراف معيار) و آمار استنباطی (آزمون من و بنتی یو) تحلیل شدند. $P < 0.05$ به عنوان سطح معنی داری لحاظ شد.

یافته ها:

نتایج به دست آمده از مشخصات فردی پرستاران نشان داد که ۶۶/۷ درصد (۶۰ نفر) زن، ۳۸/۹ درصد (۳۵ نفر) در محدوده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال، ۷۲/۲ درصد (۶۵ نفر) متاهل، ۷۵/۵ درصد (۶۸ نفر) دارای مدرک لیسانس، ۶۴/۴ درصد (۵۸ نفر) استخدام رسمی، ۳۸/۹ درصد (۳۵ نفر) دارای سابقه کار ۵ تا ۱۰ سال و ۲۱/۱ درصد (۱۹ نفر) شاغل در بخش زنان و زایمان بوده اند. مشخصات فردی بیماران نیز نشان داد ۷۳/۳ درصد (۸۸ نفر) زن، ۳۵ درصد (۴۲ نفر) در محدوده سنی ۳۵ تا ۶۸/۳ سال، ۴۳/۳ درصد (۵۸ نفر) دارای تحصیلات زیر دیپلم و ۲۹/۲ درصد (۳۵ نفر) بستری در بخش داخلی زنان بوده اند.

نتایج به دست آمده از دیدگاه پرستاران در خصوص اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار در جدول ۱ نشان داده شده است. سایر یافته ها بیانگر آن است که بین دیدگاه پرستاران و بیماران در زمینه اهمیت خدمات آموزش به بیمار اختلاف معنی دار آماری وجود دارد ($P < 0.05$) و میانگین نمره پرستاران از نمره بیماران در این مورد بیش تر است (0.682 ± 0.074 در ۴۸/۸۲ برابر 0.467 ± 0.028). به علاوه بین دیدگاه پرستاران و بیماران در خصوص اجرای خدمات آموزش به بیمار نیز اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد ($P < 0.05$) و میانگین نمره پرستاران از بیماران بیش تر است (0.384 ± 0.036 در برابر 0.2971 ± 0.088). در مورد اهمیت خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران بیشترین اهمیت، مربوط به آموزش بیماران توسط پرستاران با انگیزه بالا با میانگین نمره 0.31 ± 0.095 و در مرتبه دوم حمایت و تشویق آموزش دهنگان به بیماران با میانگین نمره 0.48 ± 0.092 قرار داشت. در مقابل کمترین اهمیت از دیدگاه پرستاران به گرفتن بازخورد مناسب در فرآیند آموزش به بیمار با میانگین نمره 0.21 ± 0.084 مربوط بوده است. از سوی دیگر یافته ها در خصوص اهمیت آموزش به بیمار از دیدگاه بیماران گویای آن بود که آموزش به بیمار توسط پرستاران با اطلاعات علمی بالا با میانگین نمره 0.38 ± 0.09 بیش ترین اهمیت را

نموده اند. نتایج یک بررسی در کشور نشان داد که عدم آگاهی پرستاران و عدم برخورداری از اطلاعات علمی بالا، بالاهمیت ترین مانع در مسیر آموزش به بیمار بوده است [۹]. در همین رابطه لوبون (Lupon) و همکاران معتقدند اهمیت اطلاعات علمی بالا برای پرستاران در خصوص آموزش به بیمار آن است که بیماران در هنگام ورود به بیمارستان تحت تنفس قرار می گیرند و عوامل متعددی مثل اضطراب، ناخوشی یا کمبود خواب می تواند قابلیت یادگیری آنان را کاهش دهد. بنابراین پرستاران دارای اطلاعات علمی بالا بهتر می توانند در آموزش به بیماران موفقیت کسب کنند [۱۰]. عباسی و همکاران با بررسی دیدگاه ۳۵۱ پرستار در شهر قم که به روش نمونه گیری در دسترس آن ها را مورد مطالعه قرار داده بودند، یکی از عوامل تسهیل کننده آموزش به بیمار را در نظر گرفتن یک الی دو پرستار برای این فرایند ذکر نموده اند [۱۱]. این در حالی است که مطالعات انجام شده در کشور کمبود کارکنان پرستاری را مهم ترین مانع در راه آموزش به بیمار ذکر نموده اند [۸ و ۱۲]. این نتایج گویای آن است که اختصاص یک پرستار ویژه برای آموزش به بیمار تاکنون امکان پذیر نبوده است، لیکن با جذب بیش تر فارغ-التحصیلان پرستاری می توان بر این مانع فائق آمد. در این میان بیماران، فضای مناسب آموزشی را دارای کم ترین اهمیت در مورد آموزش به خود دانسته اند، در حالی که صاحب نظران بر این باورند که فرد بیمار محور تمام فعالیت های یادگیری می باشد و باید دریافت اطلاعات را در فضای مناسب مد نظر قرار دهد زیرا فضای مناسب، نقش مهمی در فرایند یادگیری دارد و می تواند ضمن افزایش تمرکز در یادگیرنده، به خاطر سپاری مطالعه آموزشی را نیز تداوم بخشد [۷]. بررسی دیدگاه پرستاران نشان داد اجرای آموزش به بیمار بر طبق نیازهای آموزشی وی و در نظر داشتن وقت برای اجرای آموزش به بیمار از اولویت های مهم در اجرای خدمات آموزش به بیمار بوده اند و امکان ارائه خدمات آموزشی به خانواده بیمار، کمترین اجرا را داشته است. رفیعی و همکاران در بررسی واقع گرایانه بودن یادگیری محتوای آموزشی برای بیماران دریافتند، پرستاران در هنگام تعیین نیازهای آموزشی بیماران باید دیدگاه آنان را به طور کامل در نظر بگیرند [۱۳]. با این حال وفاکی و همکار طی مطالعه خود در شهر مشهد بیان داشتند، تنها ۴۲ درصد از بیماران آموزش های لازم را مطابق نیاز آموزشی شان دریافت نموده اند [۱۴]. علاوه بر آن به نداشتن وقت لازم برای اجرای آموزش به بیمار نیز طی مطالعات انجام شده در کشور اشاره شده است [۸ و ۱۱ و ۱۲]. که همین امر توجیه کننده عدم امکان اجرای خدمات آموزشی به خانواده بیماران نیز خواهد بود، در حالی که نقش مکمل خانواده ها در بهبود بیماران به دنبال دریافت اطلاعات مرتبط با بیماری آنها شناخته شده است [۱۵]. بنابراین با عنایت به اهمیت نقش

از بخش های تخصصی کار پرستاری می باشد و در عین حال یکی از مسئولیت های اخلاقی پرستاران به شمار می رود. به علاوه اهمیت آموزش به بیمار برای پرستاران در آن است که باید اطلاعات لازم را به بیماران و بستگان آن ها ارائه نمایند [۵]. همچنین یافته ها نشان داد بین دیدگاه پرستاران و بیماران در مورد اجرای خدمات آموزش به بیمار اختلاف معنی دار آماری وجود داشته است و میانگین نمره پرستاران در این خصوص از میانگین نمره بیماران بیش تر است. با توجه به نتایج حاصل، علی رغم آن که آموزش به بیمار از نظر پرستاران اجرای زیادتری دارد ولی از نظر بیماران آموزش به آنان کمتر اجرا می شود و میانگین نمره بیماران از پرستاران درباره اجرای آموزش به بیمار کمتر است. شاید این یافته را چنین بتوان توجیه نمود که کوتاه تر شدن مدت اقامت بیماران در بیمارستان در مقایسه با گذشته، زمان کمی را برای آموزش در اختیار پرستاران قرار می دهد. از سوی دیگر بیماران نیز در طول مدت بستری فاقد قابلیت های جسمی و روانی برای تمرکز بر محتوای آموزشی هستند [۶]. که این امر بر دیدگاه بیماران مبنی بر اجرای کم آموزش به بیمار بی تاثیر نیست. همان طور که در قسمت یافته ها ذکر شد، بیشترین اهمیت آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران به ترتیب مربوط به آموزش به بیمار توسط پرستاران با انگیزه بالا و حمایت و تشویق آموزش دهنده اند و کم ترین اهمیت مربوط به گرفتن بازخورد مناسب در فرایند آموزش به بیمار بود. نتایج مطالعه ای در همین زمینه نشان داده که پرستاران نقش زیادی برای خود در مورد آموزش به بیمار قائل نبوده اند و از انگیزه بالا برای این کار برخوردار نیستند [۷]. مردانیان در مطالعه خود به این نتیجه رسید که مسئولین بیمارستان ها پرستاران را در قبال ایفای نقش آموزشی مورد تشویق و حمایت قرار نمی دهند [۴]. در تحقیقی دیگر که به منظور بررسی موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران در شهر اهواز انجام شد، پرستار به روش تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند و یکی از مهم ترین موانع در این باره، عدم حمایت مدیریت خدمات پرستاری از آموزش دهنده کان عنوان گردید [۸]. از سوی دیگر این که پرستاران گرفتن بازخورد مناسب از بیمار را دارای کم ترین اهمیت در امر آموزش به وی دانسته اند، به نظر می رسد این یافته با کمبود وقت از طرف پرستاران قابل توجیه باشد زیرا به دلیل فقدان وقت کافی، پرستاران نمی توانند منتظر دریافت بازخورد از بیمار بمانند و ترجیح می دهند با توجه به حجم کار زیاد در بخش، بعد از انجام آموزش به بیمار سایر امور محله را پی گیری نمایند. در این مطالعه، بیماران با اهمیت ترین گزینه های مربوط را، آموزش به بیمار توسط پرستاران با اطلاعات علمی بالا و اختصاص یک پرستار ویژه جهت این امر دانسته اند و کم ترین اهمیت را مربوط به فضای مناسب آموزشی ذکر

بیش تر، به پرستاران اهمیت بیش تر آموزش به بیمار را آموخته است و بر دیدگاه آنان در زمینه اجرای آموزش به بیمار موثر بوده است.

به طور کلی اگرچه در اجرای آموزش به بیمار موانع موجود می باشد ولی به معنای آن نیست که اهمیتی از نظر پرستاران ندارد و به منظور بررسی نقش عوامل مختلف در این راستا، باید مطالعات دیگری انجام شود. از سوی دیگر، با توجه به این که ارائه مراقبت بر مبنای دیدگاه بیماران در بهبود کیفیت مراقبت ها موثر می باشد، می توان در راستای فراهم نمودن مواردی که از منظور بیماران مهم است و کمتر اجرا می شود، اقدام کرد تا بتوان با موانع موجود در راه آموزش به بیمار مقابله نمود. علاوه بر آن، تدوین برنامه آموزشی برای پرستاران و تعیین جایگاه آموزش برای آنان به عنوان عناصر اصلی نظام سلامت که بیش ترین زمان را با بیماران می گذرانند، حائز اهمیت فراوان می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه در زمینه های مدیریت، آموزش و خدمات بالینی در پرستاری کاربرد دارد. در خاتمه به عنوان محدودیت پژوهش، به جمع آوری داده ها از یک بیمارستان و حجم کم نمونه آن می توان اشاره کرد که تعیین یافته ها را با دشواری رو برو می کند. لذا پیشنهاد می شود تحقیقات آتی در چندین بیمارستان و با حجم نمونه بیش تر انجام پذیرد.

تقدیر و تشکر: نویسندها بر خود لازم می دانند از همکاری صمیمانه کارکنان پرستاری و بیماران عزیز شرکت کنند در تحقیق که بدون یاری آنان انجام این تحقیق میسر نبوده است، تشکر نمایند.

خانواده ها در بهبودی بیماران، لازم است تدبیری اندیشه شود تا امکان ارائه خدمات آموزشی به خانواده ها فراهم گردد. دیگر نتایج نشان داد از نظر بیماران ارتباط صحیح در هنگام آموزش به بیمار و آموزش به بیمار توسط پرستاران با مهارت عملی بالا بیش ترین اجرا و استفاده از وسایل آموزشی مناسب، کم ترین اجرا را داشته اند. هرچند بیماران مورد مطالعه ما برقراری ارتباط صحیح از سوی پرستاران را در آموزش به بیمار دارای بیش ترین اجرا دانسته اند، نتیجه مطالعه محمدی و همکار وی نشان داد که بیش از نیمی از پرستاران مورد مطالعه، بیماران را در برقراری ارتباط در امر آموزش به بیمار ناتوان اعلام نموده اند [۹]. از آن جا که اساس حرفه پرستاری برقراری ارتباط با بیمار می باشد و آموزش به بیمار بخشی از مداخلات مراقبتی را به خود اختصاص می دهد [۱۶]، لذا شایسته است در فرایند آموزش به بیمار نیز ارتباط صحیحی برقرار شود. از طرفی پرستارانی که از مهارت های ارتباطی بالاتر برخوردارند از نگاه بیماران دارای مهارت های عملی بیش تری خواهند بود، زیرا با برقراری ارتباط صحیح قادرند اطلاعات لازم را به بیماران خود در قالب عملی منتقل نمایند [۳]. دیگر یافته پژوهش بیان داشت در آموزش به بیماران از وسایل آموزشی مناسب کمتر استفاده شده است. در سایر مطالعات نیز کمبود وسایل آموزشی را در کنار سایر موانع آموزش به بیمار ذکر نموده اند [۸ و ۱۲]. در این رابطه می توان در صورت امکان به تجهیز وسایل آموزشی برای بیماران اقدام نمود که به عنوان مثال باید به نقش جزوآموزشی در قالب پمفت اشاره کرد. سایر یافته ها بیانگر آن بود که با افزایش سابقه کار پرستاران، اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار بیش تر می شود. در واقع می توان گفت برخورداری از سوابق خدمت

Reference:

1. Taylor C, Lillis C, LeMone P, et al. Fundamentals of nursing: the art and science of nursing care. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008: 101-107.
2. Deyirmenjian M, Karan N, Salameh P. Preoperative patient education for open-heart patients: a source of anxiety? Patient Edu Couns 2006; 62(1): 111-7.
3. Barker R, Kober A, Hoerauf K, et al. Out-of-hospital auricular acupressure in elder patients with hip fracture: a randomized double-blinded trial. Acad Emerg Med 2006; 13(1): 19-23.
4. Mardanian L. Assessing the nurses perception about patient training in Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan Univ Med Sci J 2007; 17(25): 18-40. (Persian)
5. Nicolaides-Bouman A, Van Rossum E, Habets H, et al. Home visiting programme for older people with health problems: process evaluation. J Adv Nurs 2007; 58(5): 425-35.
6. Clark JC, Lan VM. Heart failure patient learning needs after hospital discharge. Appl Nurs Res 2004; 17(3): 150-7.
7. De la Porte PW, Lok DJ, Van Veldhuisen DJ, et al. Added value of a physician-and-nurse-directed heart failure clinic: results from the Deventer-Alkmaar heart failure study. Heart 2007; 93(7): 819 - 25.
8. Mardani Hamuleh M. Patient education barriers in the view of nurses. The National Congress of Nursing and Midwifery. 2005. Social Security Organization, Tehran: Iran. (Persian)
9. Mohammadi M, Dadkhah B. Nurses attitude toward patient training. Isfahan Univ Med Sci J 2005; 23: 61-3. (Persian)
10. Lupon J, Gonzalez B, Mas D, et al. Patients self-care improvement with nurse education intervention in Spain assessed by the European heart failure self-care behavior scale. Eur J Cardiovas Nurs 2008; 7(1): 16 - 20.
11. Abbasi M, Nouruzi M, Mehran N. Patient training barriers in the view of nurses and presenting the facilitator factors in medical affiliated Qom hospitals. Hosp J 2008; 7(3): 13-6. (Persian)
12. Mazaheri E. Barriers for elderly patient training from the viewpoint of Ardebil University of Medical Sciences. Dena J 2007; 1(1): 75-80. (Persian)
13. Rafii F, Shahpoorian F, Nasher Z, et al. The

- importance of learning needs of CHF patients from patients and nurses perspective. *Iran J Nurs* 2009; 22(57): 19-30. (Persian)
14. Vafaei Najar A, Shidfar M. Patient training at Mashad University of Medical Sciences hospitals and influential organizational factors. *Health Syst J* 2009; 1(1): 31-40. (Persian)
15. Kendall S, Deacon-Crouch M, Raymond K. Nurses attitudes toward their role in patient discharge medication education and toward collaboration with hospital pharmacists: a staff development issue. *J Nurses Staff Dev* 2007; 23(4): 173-9.
16. Glanz K, Rimer BK. Theory at a glance: a guide for health promotion. New York: United States National Cancer Instit; 2008: 43.

A comparison of the importance of patient educational programs in the viewpoint of nurses and patients

Mardani Hamuleh M^{*1}, Shahraki Vahed A², Roozitalab M³

Received: 07/04/2010

Revised: 12/01/2010

Accepted: 01/27/2011

1. Dept .of Nursing, School of Nursing, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Dept .of Nursing, School of Nursing, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran
3. Dept .of Nursing, School of Nursing, Yasouj University of Medical Sciences, Yasouj, Iran

Journal of Jahrom University of Medical Sciences Vol. 8, No. 4, Winter 2011

Abstract:

Introduction:

Patient education has many advantages such as increase in the clients' satisfaction, improvement of life quality, decrease in the side effects of the disease and treatment expenditure, and decrease in the patients' readmission. The main objective of this study was to compare the importance and performance of patient educational programs in the viewpoint of nurses and patients.

Material and Methods:

In this descriptive cross-sectional study, all the nurses employed in Fatemeh Zahra hospital of Najafabad (n=90) and 120 patients were selected through convenience sampling method and recruited to the study. Data were gathered using self-designed questionnaires. The collected data were analyzed by SPSS software using descriptive and analytical statistics (Mann Whitney U).

Results:

The findings showed that there were significant differences between the viewpoint of the nurses and patients about the importance and performance of patient educational programs ($P<0.005$). The scores of the nurses on the importance of such services and the performance of patient education (38.64 vs. 27.91) were higher than those of the patients. (48.82 vs. 46.28). From the point of view of the nurses, patient education by highly motivated nurses and based on their educational needs were the most important measures which needs to be tackled. However, from point of view of the patients, patient education by highly knowledgeable nurses and appropriate communication skills during patient education were the most significant measures which should be taken into account.

Conclusion:

The mean score of the nurses about the importance and performance of patient education programs were higher than those of the patients. The results can contribute to the improvement in the quality of care for the patients.

Keywords: Education, Nurse, Patient